

表 304 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢別,原疾患別)原疾患=急速進行性糸球体腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)										1 (50.0)		3 (42.9)	1 (10.0)	4 (14.3)	8 (19.5)	12 (18.5)	22 (26.2)	11 (20.0)	4 (16.7)	4 (50.0)	70 (21.5)			70 (21.5)	79.29	9.77
脳血管障害 (%)												1 (14.3)	2 (20.0)	1 (3.6)	1 (2.4)	5 (7.7)	6 (7.1)	4 (7.3)	2 (8.3)		22 (6.8)			22 (6.8)	78.59	9.45
感染症 (%)													2 (20.0)	7 (25.0)	14 (34.1)	28 (43.1)	30 (35.7)	21 (38.2)	6 (25.0)	2 (25.0)	110 (33.8)			110 (33.8)	80.04	7.06
消化管出血 (%)													1 (10.0)				1 (1.2)	2 (3.6)	1 (4.2)		8 (2.5)			8 (2.5)	79.00	9.77
悪性腫瘍 (%)												2 (28.6)	1 (10.0)	8 (28.6)	5 (12.2)	4 (6.2)	5 (6.0)	2 (3.6)			27 (8.3)			27 (8.3)	72.63	8.27
悪液質/尿毒症 (%)															1 (2.4)	2 (3.1)	6 (7.1)	3 (5.5)	4 (16.7)	1 (12.5)	17 (5.2)			17 (5.2)	84.88	5.99
心筋梗塞 (%)														1 (3.6)		1 (1.5)	2 (2.4)	1 (1.8)	2 (8.3)		7 (2.2)			7 (2.2)	82.00	8.76
カリウム中毒/頓死 (%)																2 (3.1)	2 (2.4)	1 (1.8)			5 (1.5)			5 (1.5)	81.60	3.78
肝硬変症 (%)														1 (3.6)	1 (2.4)		2 (2.4)				4 (1.2)			4 (1.2)	76.50	7.59
自殺/拒否 (%)										1 (50.0)						1 (1.5)					2 (0.6)			2 (0.6)	60.50	20.51
腫瘍塞 (%)															2 (4.9)		1 (1.2)				3 (0.9)			3 (0.9)	75.33	6.66
肺血栓/肺塞栓 (%)																				1 (12.5)	1 (0.3)			1 (0.3)	95.00	
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)									1 (100.0)			1 (14.3)	2 (20.0)	3 (10.7)	4 (9.8)	5 (7.7)	4 (4.8)	5 (9.1)	2 (8.3)		27 (8.3)			27 (8.3)	75.89	11.20
不明 (%)													1 (10.0)	3 (10.7)	2 (4.9)	5 (7.7)	3 (3.6)	5 (9.1)	3 (12.5)		22 (6.8)			22 (6.8)	79.23	8.13
合計 (%)									1 (100.0)	2 (100.0)		7 (100.0)	10 (100.0)	28 (100.0)	41 (100.0)	65 (100.0)	84 (100.0)	55 (100.0)	24 (100.0)	8 (100.0)	325 (100.0)			325 (100.0)	78.90	8.95
記載なし																										
総計									1	2		7	10	28	41	65	84	55	24	8	325			325	78.90	8.95

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。  
##A0239##  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査