

表 305 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢別,原疾患別)原疾患=妊娠腎/妊娠中毒症

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)												1 (100.0)	2 (33.3)	2 (14.3)	6 (33.3)	3 (42.9)	4 (44.4)	1 (16.7)			19 (30.6)			19 (30.6)	73.21	7.69
脳血管障害 (%)													1 (16.7)		1 (5.6)			2 (33.3)			4 (6.5)			4 (6.5)	77.50	12.12
感染症 (%)										1 (100.0)		2 (33.3)		1 (7.1)	5 (27.8)						9 (14.5)			9 (14.5)	66.11	9.39
消化管出血 (%)															2 (11.1)						2 (3.2)			2 (3.2)	71.00	1.41
悪性腫瘍 (%)														2 (14.3)		2 (28.6)	2 (22.2)				6 (9.7)			6 (9.7)	75.17	7.57
悪液質/尿毒症 (%)																	1 (11.1)				1 (1.6)			1 (1.6)	81.00	
心筋梗塞 (%)														1 (7.1)	1 (5.6)						2 (3.2)			2 (3.2)	69.50	3.54
カリウム中毒/頓死 (%)																										
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
肺閉塞 (%)														1 (7.1)							1 (1.6)			1 (1.6)	67.00	
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																	1 (11.1)				1 (1.6)			1 (1.6)	83.00	
その他 (%)														2 (14.3)	2 (11.1)		1 (11.1)	1 (16.7)			6 (9.7)			6 (9.7)	73.67	9.65
不明 (%)													1 (16.7)	5 (35.7)	1 (5.6)	2 (28.6)		2 (33.3)			11 (17.7)			11 (17.7)	72.27	8.28
合計 (%)										1 (100.0)		1 (100.0)	6 (100.0)	14 (100.0)	18 (100.0)	7 (100.0)	9 (100.0)	6 (100.0)			62 (100.0)			62 (100.0)	72.52	8.52
記載なし																										
脚計										1		1	6	14	18	7	9	6			62			62	72.52	8.52

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。  
##A0240##  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査