

表 306 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝その他分類不能の腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)								1 (100.0)			1 (100.0)	1 (50.0)	1 (33.3)	7 (43.8)	2 (13.3)	3 (14.3)	4 (22.2)	6 (37.5)	2 (33.3)		28 (26.4)			28 (26.4)	74.50	12.24
脳血管障害 (%)													1 (33.3)		2 (13.3)	1 (4.8)					4 (3.8)			4 (3.8)	71.50	6.03
感染症 (%)										1 (50.0)		1 (33.3)	7 (43.8)			6 (28.6)	4 (22.2)	3 (18.8)	1 (16.7)	2 (50.0)	25 (23.6)			25 (23.6)	76.80	11.21
消化管出血 (%)																										
悪性腫瘍 (%)															3 (20.0)	4 (19.0)	1 (5.6)	1 (6.3)			9 (8.5)			9 (8.5)	77.00	4.47
悪液質/尿毒症 (%)																1 (4.8)		2 (12.5)	1 (16.7)		4 (3.8)			4 (3.8)	86.25	7.27
心筋梗塞 (%)																1 (4.8)		1 (6.3)			2 (1.9)			2 (1.9)	81.50	7.78
カリウム中毒/積死 (%)																										
肝硬変症 (%)			1 (100.0)											1 (6.3)							2 (1.9)			2 (1.9)	41.50	38.89
自殺/拒否 (%)												1 (50.0)							1 (16.7)		2 (1.9)			2 (1.9)	73.50	23.33
腸閉塞 (%)										1 (50.0)					2 (13.3)		1 (5.6)				4 (3.8)			4 (3.8)	68.00	13.54
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)															1 (6.7)	4 (19.0)	4 (22.2)	2 (12.5)	1 (16.7)	1 (25.0)	13 (12.3)			13 (12.3)	81.77	7.28
不明 (%)														1 (6.3)	5 (33.3)	1 (4.8)	4 (22.2)	1 (6.3)		1 (25.0)	13 (12.3)			13 (12.3)	78.54	7.38
合計 (%)			1 (100.0)					1 (100.0)		2 (100.0)	1 (100.0)	2 (100.0)	3 (100.0)	16 (100.0)	15 (100.0)	21 (100.0)	18 (100.0)	16 (100.0)	6 (100.0)	4 (100.0)	106 (100.0)			106 (100.0)	76.22	12.06
記載なし																										
総計			1					1		2	1	2	3	16	15	21	18	16	6	4	106			106	76.22	12.06

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
##A0241##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査