

表 311 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢別,原疾患別)原疾患 = SLE腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)									1 (20.0)	2 (40.0)	4 (50.0)	4 (28.6)	4 (16.7)	9 (23.7)	11 (39.3)	6 (21.4)	10 (35.7)	5 (29.4)	1 (25.0)		57 (28.5)			57 (28.5)	70.54	11.92
脳血管障害 (%)									1 (20.0)	1 (20.0)	1 (12.5)			3 (7.9)			1 (3.6)				7 (3.5)			7 (3.5)	61.00	14.01
感染症 (%)									2 (40.0)	1 (20.0)	2 (25.0)	2 (14.3)	9 (37.5)	9 (23.7)	6 (21.4)	12 (42.9)	6 (21.4)	6 (35.3)		1 (100.0)	56 (28.0)			56 (28.0)	71.25	11.46
消化管出血 (%)														1 (2.6)	1 (3.6)						2 (1.0)			2 (1.0)	70.00	5.66
悪性腫瘍 (%)									1 (20.0)		1 (12.5)		2 (8.3)	3 (7.9)	3 (10.7)	1 (3.6)	2 (7.1)				13 (6.5)			13 (6.5)	66.85	11.27
悪液質/尿毒症 (%)													1 (4.2)	2 (5.3)	1 (3.6)	2 (7.1)	1 (3.6)	1 (5.9)		1 (25.0)	9 (4.5)			9 (4.5)	75.89	10.71
心筋梗塞 (%)												1 (7.1)	1 (4.2)	1 (2.6)			1 (3.6)				5 (2.5)			5 (2.5)	68.80	10.85
カリウム中毒/頓死 (%)												1 (7.1)		2 (5.3)	1 (3.6)						4 (2.0)			4 (2.0)	65.75	7.41
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
腫瘍塞 (%)															1 (3.6)		1 (3.6)	1 (5.9)			3 (1.5)			3 (1.5)	80.00	6.00
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)										1 (20.0)		2 (14.3)	4 (16.7)	7 (18.4)	2 (7.1)	5 (17.9)	3 (10.7)	3 (17.6)	2 (50.0)		29 (14.5)			29 (14.5)	72.52	11.17
不明 (%)												4 (28.6)	3 (12.5)	1 (2.6)	2 (7.1)	1 (3.6)	3 (10.7)	1 (5.9)		1 (25.0)	15 (7.5)			15 (7.5)	69.00	11.13
合計 (%)									5 (100.0)	5 (100.0)	8 (100.0)	14 (100.0)	24 (100.0)	38 (100.0)	28 (100.0)	28 (100.0)	28 (100.0)	17 (100.0)	4 (100.0)	1 (100.0)	200 (100.0)			200 (100.0)	70.58	11.52
記載なし																										
脚計									5	5	8	14	24	38	28	28	28	17	4	1	200			200	70.58	11.52

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
##A0246##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査