

表 312 2016年死亡患者死原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患 = アミロイド腎

死因	5歳未満	5歳~	10歳~	15歳~	20歳~	25歳~	30歳~	35歳~	40歳~	45歳~	50歳~	55歳~	60歳~	65歳~	70歳~	75歳~	80歳~	85歳~	90歳~	95歳~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
心不全 (%)										1 (33.3)	1 (33.3)	2 (50.0)	3 (42.9)	3 (23.1)	2 (20.0)	9 (40.9)	4 (23.5)				25 (29.1)			25 (29.1)	70.32	10.72	
脳血管障害 (%)										2 (66.7)		1 (25.0)	1 (14.3)	3 (23.1)	2 (10.0)	1 (13.6)	4 (23.5)	2 (33.3)			3 (3.5)	3 (19.8)	3 (17.4)	3 (19.8)	71.00	6.93	
感染症 (%)																					17 (19.8)	17 (19.8)	17 (19.8)	17 (19.8)	71.41	13.85	
消化管出血 (%)																											
悪性腫瘍 (%)																					15 (17.4)	15 (17.4)	15 (17.4)	15 (17.4)	75.20	6.27	
悪液質/尿毒症 (%)																					5 (5.8)	5 (5.8)	5 (5.8)	5 (5.8)	71.80	8.70	
心筋梗塞 (%)																					2 (2.3)	2 (2.3)	2 (2.3)	2 (2.3)	75.50	7.78	
カリウム中毒/頻死 (%)																					1 (1.2)	1 (1.2)	1 (1.2)	1 (1.2)	46.00		
肝硬変症 (%)																					2 (2.3)	2 (2.3)	2 (2.3)	2 (2.3)	79.00	9.90	
自殺/拒否 (%)																											
腸閉塞 (%)																											
肺血栓/肺塞栓 (%)																											
災害・事故死 (%)																											
その他 (%)																					10 (11.6)	10 (11.6)	10 (11.6)	10 (11.6)	74.80	11.47	
不明 (%)																					6 (7.0)	6 (7.0)	6 (7.0)	6 (7.0)	77.17	13.59	
合計 (%)										3 (100.0)	3 (100.0)	4 (100.0)	7 (100.0)	13 (100.0)	10 (100.0)	22 (100.0)	17 (100.0)	6 (100.0)	1 (100.0)		86 (100.0)			86 (100.0)	72.53	11.00	
記載なし																											
総計										3 (100.0)	3 (100.0)	4 (100.0)	7 (100.0)	13 (100.0)	10 (100.0)	22 (100.0)	17 (100.0)	6 (100.0)	1 (100.0)		86 (100.0)			86 (100.0)	72.53	11.00	

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0247##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査