

表 313 2016年死亡患者死因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=痛風腎

死因	5歳未満	5歳~	10歳~	15歳~	20歳~	25歳~	30歳~	35歳~	40歳~	45歳~	50歳~	55歳~	60歳~	65歳~	70歳~	75歳~	80歳~	85歳~	90歳~	95歳~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)											1 (100.0)				3 (25.0)	2 (12.5)	3 (21.4)	3 (25.0)			12 (17.9)			12 (17.9)	77.50	10.34
脳血管障害 (%)												1 (12.5)			1 (6.3)	1 (7.1)					3 (4.5)			3 (4.5)	76.67	7.51
感染症 (%)												1 (50.0)	4 (50.0)	2 (16.7)	6 (37.5)	5 (35.7)	2 (16.7)	1 (50.0)			21 (31.3)			21 (31.3)	76.76	7.84
消化管出血 (%)																1 (7.1)	1 (8.3)			2 (3.0)			2 (3.0)	84.50	0.71	
悪性腫瘍 (%)												1 (50.0)	2 (25.0)	2 (16.7)	1 (6.3)	2 (14.3)	1 (8.3)				9 (13.4)			9 (13.4)	74.44	8.80
悪液質/尿毒症 (%)															1 (8.3)	1 (6.3)	1 (8.3)			3 (4.5)			3 (4.5)	79.33	8.08	
心筋梗塞 (%)																1 (6.3)				1 (1.5)			1 (1.5)	77.00		
カリウム中毒/脳死 (%)																										
肝梗塞症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
腸閉塞 (%)																										
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)																					5 (7.5)		5 (7.5)	83.00	4.85	
不明 (%)																					11 (16.4)		11 (16.4)	78.00	7.25	
合計 (%)											1 (100.0)	2 (100.0)	8 (100.0)	12 (100.0)	16 (100.0)	14 (100.0)	12 (100.0)	2 (100.0)			67 (100.0)			67 (100.0)	77.60	8.02
記載なし																										
総計											1	2	8	12	16	14	12	2		67			67	77.60	8.02	

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

#A0248#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査