

表 314 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢別,原疾患別)原疾患=先天性代謝異常に基づく腎不全

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)														2 (100.0)				2 (66.7)			4 (26.7)			4 (26.7)	75.50	12.12
脳血管障害 (%)									1 (100.0)								1 (50.0)				2 (13.3)			2 (13.3)	61.50	30.41
感染症 (%)															2 (100.0)						2 (13.3)			2 (13.3)	73.00	
消化管出血 (%)												1 (33.3)									1 (6.7)			1 (6.7)	58.00	
悪性腫瘍 (%)											1 (100.0)	1 (33.3)									2 (13.3)			2 (13.3)	54.00	5.66
悪液質/尿毒症 (%)																		1 (33.3)			1 (6.7)			1 (6.7)	85.00	
心筋梗塞 (%)																										
カリウム中毒/頓死 (%)																										
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
肺閉塞 (%)																										
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																	1 (50.0)				1 (6.7)			1 (6.7)	81.00	
その他 (%)						1 (100.0)						1 (33.3)									2 (13.3)			2 (13.3)	41.50	20.51
不明 (%)																										
合計 (%)						1 (100.0)			1 (100.0)		1 (100.0)	3 (100.0)		2 (100.0)	2 (100.0)		2 (100.0)	3 (100.0)			15 (100.0)			15 (100.0)	65.73	17.84
記載なし																										
脚計						1			1		1	3		2	2		2	3			15			15	65.73	17.84

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
##A0249##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査