

表 316 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢別,原疾患別)原疾患=腎・尿路結石

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)											1 (100.0)			2 (40.0)	2 (16.7)	1 (16.7)	3 (21.4)	3 (37.5)	2 (33.3)		14 (24.6)			14 (24.6)	78.50	10.57
脳血管障害 (%)													1 (33.3)				1 (7.1)				2 (3.5)			2 (3.5)	72.00	12.73
感染症 (%)												1 (33.3)			3 (25.0)	1 (16.7)	1 (7.1)	1 (12.5)			7 (12.3)			7 (12.3)	75.57	8.64
消化管出血 (%)																	1 (7.1)		1 (16.7)		2 (3.5)			2 (3.5)	87.00	4.24
悪性腫瘍 (%)														1 (20.0)	3 (25.0)	3 (50.0)	3 (21.4)	1 (12.5)			11 (19.3)			11 (19.3)	76.64	6.04
悪液質/尿毒症 (%)																		1 (12.5)	1 (16.7)		2 (3.5)			2 (3.5)	89.50	0.71
心筋梗塞 (%)																		1 (12.5)			1 (1.8)			1 (1.8)	85.00	
カリウム中毒/頓死 (%)															1 (8.3)		1 (7.1)				2 (3.5)			2 (3.5)	77.00	9.90
肝硬変症 (%)														1 (20.0)	1 (8.3)	1 (16.7)					3 (5.3)			3 (5.3)	73.67	4.51
自殺/拒否 (%)																										
腫瘍塞 (%)																			1 (16.7)		1 (1.8)			1 (1.8)	92.00	
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)															1 (8.3)		3 (21.4)	1 (12.5)	1 (16.7)	1 (50.0)	7 (12.3)			7 (12.3)	84.71	8.36
不明 (%)											1 (33.3)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (20.0)	1 (8.3)		1 (7.1)			1 (50.0)	5 (8.8)			5 (8.8)	75.40	14.35
合計 (%)											1 (100.0)		3 (100.0)	5 (100.0)	12 (100.0)	6 (100.0)	14 (100.0)	8 (100.0)	6 (100.0)	2 (100.0)	57 (100.0)			57 (100.0)	78.77	9.46
記載なし																										
脚計											1		3	5	12	6	14	8	6	2	57			57	78.77	9.46

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
##A0251##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査