

表 317 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢別,原疾患別)原疾患=腎・尿路腫瘍

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)														1 (4.8)	2 (10.0)	3 (10.7)	1 (4.0)	5 (22.7)	1 (9.1)		13 (9.6)			13 (9.6)	80.77	7.12
脳血管障害 (%)														1 (4.8)			1 (4.0)				2 (1.5)			2 (1.5)	74.00	8.49
感染症 (%)										1 (100.0)				1 (4.8)	2 (10.0)	4 (14.3)	6 (24.0)	4 (18.2)	4 (36.4)		22 (16.2)			22 (16.2)	80.45	10.22
消化管出血 (%)																1 (3.6)		1 (4.5)			2 (1.5)			2 (1.5)	83.00	7.07
悪性腫瘍 (%)											2 (100.0)		3 (75.0)	15 (71.4)	13 (65.0)	14 (50.0)	13 (52.0)	10 (45.5)	2 (18.2)		72 (52.9)			72 (52.9)	75.31	8.33
悪液質/尿毒症 (%)														1 (4.8)							1 (0.7)			1 (0.7)	68.00	
心筋梗塞 (%)																1 (3.6)			1 (9.1)		2 (1.5)			2 (1.5)	84.50	7.78
カリウム中毒/頓死 (%)																	1 (4.0)				1 (0.7)			1 (0.7)	84.00	
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
腫瘍塞 (%)																										
肺血栓/肺塞栓 (%)												1 (100.0)				1 (3.6)					2 (1.5)			2 (1.5)	68.00	15.56
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)													1 (25.0)		2 (10.0)	2 (7.1)	1 (4.0)		2 (18.2)		8 (5.9)			8 (5.9)	78.50	10.49
不明 (%)														2 (9.5)	1 (5.0)	2 (7.1)	2 (8.0)	2 (9.1)	1 (9.1)		11 (8.1)			11 (8.1)	75.73	14.53
合計 (%)								1 (100.0)		1 (100.0)	2 (100.0)	1 (100.0)	4 (100.0)	21 (100.0)	20 (100.0)	28 (100.0)	25 (100.0)	22 (100.0)	11 (100.0)		136 (100.0)			136 (100.0)	77.01	9.51
記載なし																										
総計								1		1	2	1	4	21	20	28	25	22	11		136			136	77.01	9.51

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
##A0252##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査