

表 318 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝閉塞性尿路障害

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)											1 (33.3)			3 (37.5)	1 (14.3)	3 (16.7)	3 (18.8)	5 (41.7)	1 (16.7)		17 (21.8)			17 (21.8)	77.65	10.85
脳血管障害 (%)													1 (33.3)								1 (1.3)			1 (1.3)	62.00	
感染症 (%)							1 (100.0)			1 (100.0)						4 (22.2)	1 (6.3)	1 (8.3)	3 (50.0)	1 (50.0)	12 (15.4)			12 (15.4)	76.83	18.68
消化管出血 (%)																		1 (8.3)			1 (1.3)			1 (1.3)	86.00	
悪性腫瘍 (%)											1 (33.3)	1 (100.0)	2 (66.7)		4 (57.1)	4 (22.2)	5 (31.3)	1 (8.3)			18 (23.1)			18 (23.1)	74.06	9.76
悪液質/尿毒症 (%)																1 (5.6)	2 (12.5)		1 (16.7)	1 (50.0)	5 (6.4)			5 (6.4)	84.80	8.23
心筋梗塞 (%)																1 (5.6)	1 (6.3)				2 (2.6)			2 (2.6)	79.50	0.71
カリウム中毒/積死 (%)														1 (12.5)							1 (1.3)			1 (1.3)	67.00	
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																1 (5.6)					1 (1.3)			1 (1.3)	76.00	
腸閉塞 (%)														1 (12.5)				1 (8.3)			2 (2.6)			2 (2.6)	77.00	12.73
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																1 (5.6)	1 (6.3)				2 (2.6)			2 (2.6)	80.50	4.95
その他 (%)															2 (28.6)	2 (11.1)	1 (6.3)	2 (16.7)			7 (9.0)			7 (9.0)	79.86	7.03
不明 (%)											1 (33.3)			3 (37.5)		1 (5.6)	2 (12.5)	1 (8.3)	1 (16.7)		9 (11.5)			9 (11.5)	74.67	12.10
合計 (%)							1 (100.0)			1 (100.0)	3 (100.0)	1 (100.0)	3 (100.0)	8 (100.0)	7 (100.0)	18 (100.0)	16 (100.0)	12 (100.0)	6 (100.0)	2 (100.0)	78 (100.0)			78 (100.0)	76.86	11.56
記載なし																										
総計							1			1	3	1	3	8	7	18	16	12	6	2	78			78	76.86	11.56

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
##A0253##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査