

表 322 2016年死亡患者死原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患 = 移植後再導入

死因	5歳未満	5歳~	10歳~	15歳~	20歳~	25歳~	30歳~	35歳~	40歳~	45歳~	50歳~	55歳~	60歳~	65歳~	70歳~	75歳~	80歳~	85歳~	90歳~	95歳~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
心不全 (%)								1 (50.0)			4 (57.1)	3 (42.9)	4 (20.0)	9 (40.9)	5 (26.3)	2 (16.7)	6 (40.0)	3 (33.3)	1 (33.3)	1 (32.0)	39		(32.0)	69.64	13.21		
脳血管障害 (%)								1 (50.0)	1 (50.0)	1 (42.9)	1 (14.3)	2 (10.0)	6 (30.0)	10 (45.5)	8 (42.1)	3 (25.0)	4 (26.7)	3 (33.3)	1 (33.3)	4 (33.6)	4	4	62.50	9.54			
感染症 (%)								1 (50.0)	1 (50.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	3 (42.9)	6 (30.0)	10 (45.5)	8 (42.1)	3 (25.0)	4 (26.7)	3 (33.3)	1 (33.3)	41 (33.6)	41	41	69.61	11.20			
消化管出血 (%)												1 (5.0)	1 (5.0)	1 (4.5)	2 (10.5)							1 (0.8)		(33.6)			
悪性腫瘍 (%)												1 (14.3)	1 (5.0)	1 (4.5)	2 (10.5)	2 (16.7)	1 (6.7)	1 (6.7)	1 (33.3)	1 (33.3)	7 (5.7)	7 (5.7)	7 (5.7)	7 (5.7)	72.86	12.86	
悪液質/尿毒症 (%)																					2 (1.6)	2 (1.6)	2 (1.6)	78.50	0.71		
心筋梗塞 (%)																					6 (4.9)	6 (4.9)	6 (4.9)	66.67	20.02		
カリウム中毒/頻死 (%)								1 (100.0)					2 (10.0)	1 (5.3)	1 (5.3)												
肝硬変症 (%)																											
自殺/拒否 (%)																											
腸閉塞 (%)																											
肺血栓/肺塞栓 (%)																											
災害・事故死 (%)																											
その他 (%)																											
不明 (%)																											
合計 (%)								1 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)		7 (100.0)	7 (100.0)	20 (100.0)	22 (100.0)	19 (100.0)	12 (100.0)	15 (100.0)	9 (100.0)	3 (100.0)	3 (100.0)	122 (100.0)			122 (100.0)	70.19	12.55
記載なし																											
総計								1	2	2		7	7	20	22	19	12	15	9	3	3	122		122	70.19	12.55	

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0257##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査