

表 323 2016年死亡患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患 = その他

死因	5歳未満	5歳~	10歳~	15歳~	20歳~	25歳~	30歳~	35歳~	40歳~	45歳~	50歳~	55歳~	60歳~	65歳~	70歳~	75歳~	80歳~	85歳~	90歳~	95歳~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差			
心不全 (%)			1 (100.0)			1 (33.3)		1 (100.0)			6 (28.6)	3 (9.7)	6 (21.4)	13 (20.6)	28 (19.4)	27 (21.9)	50 (25.0)	58 (22.2)	39 (31.5)	23 (33.3)	5 (22.5)			261 (22.5)	76.82	12.14			
脳血管障害 (%)										1 (33.3)	3 (14.3)	2 (6.5)	5 (7.1)	6 (7.9)	6 (4.3)	6 (4.3)	8 (3.5)	11 (4.7)	6 (3.4)	6 (3.4)	6 (4.3)		50 (4.3)	50 (4.3)	50 (4.3)	50 (4.3)	71.66	12.44	
感染症 (%)										1 (33.3)	1 (4.8)	7 (22.6)	5 (17.9)	7 (11.1)	31 (22.1)	31 (22.3)	49 (21.5)	62 (26.7)	47 (26.7)	17 (23.3)	2 (13.3)	2 (22.5)		260 (22.5)	77.68	9.63			
消化管出血 (%)											1 (9.5)	1 (9.7)	5 (21.4)	3 (19.0)	12 (21.4)	30 (15.8)	22 (11.0)	25 (8.6)	20 (5.1)	9 (6.8)	5 (5.1)	5 (11.6)		21 (1.8)	21 (1.8)	21 (1.8)	21 (1.8)	75.24	9.61
悪性腫瘍 (%)											2 (9.5)	3 (9.7)	6 (21.4)	12 (19.0)	30 (21.4)	22 (15.8)	25 (11.0)	20 (8.6)	20 (5.1)	9 (6.8)	5 (5.1)	5 (11.6)		134 (11.6)	72.69	9.64			
悪液質/尿毒症 (%)												1 (1.6)	1 (0.7)	2 (1.4)	7 (1.4)	7 (3.1)	7 (3.0)	4 (2.3)	4 (2.3)	2 (2.3)	1 (2.7)	1 (6.7)	1 (2.2)		25 (2.2)	80.80	8.18		
心筋梗塞 (%)											1 (4.8)	2 (6.5)	3 (4.8)	5 (3.6)	1 (0.7)	1 (1.3)	1 (3.9)	1 (2.3)	1 (2.3)	1 (2.3)	1 (2.7)	1 (6.7)	1 (2.2)		28 (2.4)	73.57	11.18		
カリウム中毒/頻死 (%)											1 (4.8)	1 (3.2)	2 (3.2)	2 (1.4)	4 (2.9)	5 (2.2)	5 (0.4)	1 (0.6)	1 (1.4)	1 (1.4)	1 (1.4)	1 (1.4)	1 (1.4)		18 (1.6)	71.67	10.59		
肝硬変症 (%)											1 (4.8)	2 (6.5)	1 (4.8)	1 (3.6)	1 (0.7)	1 (1.3)	1 (3.9)	1 (2.3)	1 (2.3)	1 (2.3)	1 (2.7)	1 (6.7)	1 (2.2)		15 (1.6)	67.00	12.11		
自殺/拒否 (%)												1 (4.8)	1 (6.5)	2 (4.8)	2 (3.6)	4 (1.4)	4 (0.7)	3 (1.3)	3 (0.4)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (1.4)	1 (1.3)	1 (1.3)		10 (1.3)	73.90	16.16	
腸閉塞 (%)												1 (4.8)	2 (6.5)	1 (4.8)	1 (3.6)	1 (1.4)	1 (0.7)	1 (1.3)	1 (0.4)	1 (1.1)	1 (1.4)	1 (1.4)	1 (1.4)	1 (1.4)		16 (1.4)	78.06	7.00	
肺血栓/肺塞栓 (%)												1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (0.7)	1 (0.4)	1 (0.9)	1 (0.4)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)		5 (0.4)	71.40	14.86	
災害・事故死 (%)												1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	1 (0.7)	1 (0.4)	1 (0.9)	1 (0.4)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)		4 (0.3)	82.25	2.99	
その他 (%)												2 (66.7)	1 (50.0)	1 (33.3)	2 (9.5)	5 (16.1)	3 (10.7)	6 (9.5)	17 (12.1)	23 (16.5)	38 (16.7)	34 (14.7)	37 (21.0)	17 (23.3)	3 (20.0)		189 (16.3)	77.35	12.25
不明 (%)	1 (100.0)											1 (50.0)	1 (33.3)	1 (4.8)	3 (14.3)	5 (19.4)	8 (14.3)	8 (12.7)	12 (8.6)	15 (10.8)	17 (11.4)	19 (7.3)	19 (10.8)	6 (8.2)	4 (26.7)	122 (10.5)	74.58	13.57	
合計	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	3 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	2 (100.0)	3 (100.0)	21 (100.0)	31 (100.0)	28 (100.0)	63 (100.0)	140 (100.0)	139 (100.0)	228 (100.0)	232 (100.0)	232 (100.0)	176 (100.0)	73 (100.0)	15 (100.0)	1,158 (100.0)		1,158 (100.0)	75.92	11.54				
記載なし																													
総計	1	1	3	1	1	2	3	21	31	28	63	140	139	228	232	176	73	15	1,158		1,158	75.92	11.54						

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0259##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査