

表 325 2016年死亡患者死因の詳細(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	4,151 (20.6)	2,343 (22.4)	6,494 (21.2)		6,494 (21.2)
肺水腫(溢水)	214 (1.1)	87 (0.8)	301 (1.0)		301 (1.0)
急性心筋梗塞(発症30日以内死亡)	589 (2.9)	239 (2.3)	828 (2.7)		828 (2.7)
虚血性心疾患(急性心筋梗塞以外)	264 (1.3)	118 (1.1)	382 (1.2)		382 (1.2)
不整脈、伝導障害	302 (1.5)	129 (1.2)	431 (1.4)		431 (1.4)
心内膜炎および弁膜症	115 (0.6)	71 (0.7)	186 (0.6)		186 (0.6)
その他の心疾患	294 (1.5)	181 (1.7)	475 (1.6)		475 (1.6)
心膜下出血	90 (0.4)	66 (0.6)	156 (0.5)		156 (0.5)
脳内出血	648 (3.2)	276 (2.6)	924 (3.0)		924 (3.0)
脳梗塞	405 (2.0)	297 (2.8)	702 (2.3)		702 (2.3)
その他の脳血管疾患	127 (0.6)	70 (0.7)	197 (0.6)		197 (0.6)
敗血症	1,537 (7.6)	939 (9.0)	2,476 (8.1)		2,476 (8.1)
中枢神経系感染症	15 (0.1)	8 (0.1)	23 (0.1)		23 (0.1)
肺炎	2,610 (12.9)	985 (9.4)	3,595 (11.7)		3,595 (11.7)
インフルエンザ	18 (0.1)	13 (0.1)	31 (0.1)		31 (0.1)
尿路感染症	13 (0.1)	11 (0.1)	24 (0.1)		24 (0.1)
消化管・胆道系感染症・腹膜炎	134 (0.7)	94 (0.9)	228 (0.7)		228 (0.7)
劇症(急性)ウイルス肝炎	7 (0.0)	1 (0.0)	8 (0.0)		8 (0.0)
結核	31 (0.2)	13 (0.1)	44 (0.1)		44 (0.1)
ヒト免疫不全ウイルス[HIV]感染症	1 (0.0)		1 (0.0)		1 (0.0)
その他の感染症	186 (0.9)	109 (1.0)	295 (1.0)		295 (1.0)
中枢神経系の悪性新生物	17 (0.1)	14 (0.1)	31 (0.1)		31 (0.1)
呼吸器系の悪性新生物	424 (2.1)	111 (1.1)	535 (1.7)		535 (1.7)
肝癌	322 (1.6)	106 (1.0)	428 (1.4)		428 (1.4)
肝癌以外の消化器系の悪性新生物	577 (2.9)	217 (2.1)	794 (2.6)		794 (2.6)
乳房の悪性新生物	5 (0.0)	46 (0.4)	51 (0.2)		51 (0.2)
性器の悪性新生物	45 (0.2)	32 (0.3)	77 (0.3)		77 (0.3)
腎の悪性新生物	188 (0.9)	49 (0.5)	237 (0.8)		237 (0.8)
内分泌腺の悪性新生物	48 (0.2)	17 (0.2)	65 (0.2)		65 (0.2)
造血・リンパ組織の悪性新生物	175 (0.9)	99 (0.9)	274 (0.9)		274 (0.9)
その他の悪性新生物	340 (1.7)	135 (1.3)	475 (1.6)		475 (1.6)
ウイルス性肝硬変	65 (0.3)	23 (0.2)	88 (0.3)		88 (0.3)
ウイルス性以外の肝硬変	114 (0.6)	48 (0.5)	162 (0.5)		162 (0.5)
腸の血行障害	122 (0.6)	70 (0.7)	192 (0.6)		192 (0.6)
イレウス	82 (0.4)	52 (0.5)	134 (0.4)		134 (0.4)
消化管出血	240 (1.2)	155 (1.5)	395 (1.3)		395 (1.3)
被囊性腹膜硬化症	2 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)		4 (0.0)
その他の消化器疾患	146 (0.7)	79 (0.8)	225 (0.7)		225 (0.7)
肺梗塞、肺塞栓症	35 (0.2)	25 (0.2)	60 (0.2)		60 (0.2)
悪液質	380 (1.9)	304 (2.9)	684 (2.2)		684 (2.2)
尿毒症	210 (1.0)	178 (1.7)	388 (1.3)		388 (1.3)
認知症	38 (0.2)	20 (0.2)	58 (0.2)		58 (0.2)
その他の悪液質/尿毒症	91 (0.5)	58 (0.6)	149 (0.5)		149 (0.5)
高カリウム血症	64 (0.3)	19 (0.2)	83 (0.3)		83 (0.3)
原因不明の突然死	456 (2.3)	203 (1.9)	659 (2.2)		659 (2.2)
自殺	60 (0.3)	14 (0.1)	74 (0.2)		74 (0.2)
治療拒否(透析拒否)	82 (0.4)	43 (0.4)	125 (0.4)		125 (0.4)
災害・事故死	117 (0.6)	45 (0.4)	162 (0.5)		162 (0.5)
その他	1,735 (8.6)	1,118 (10.7)	2,853 (9.3)		2,853 (9.3)
不明	2,267 (11.2)	1,108 (10.6)	3,375 (11.0)		3,375 (11.0)
合計	20,198 (100.0)	10,440 (100.0)	30,638 (100.0)		30,638 (100.0)
記載なし	1	1	2		2
総計	20,199	10,441	30,640		30,640

数値右のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0260##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査