

表 436 1992年導入患者治療方法、性別(2016年末)

| 治療方法 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 施設血液透析 (%) | 661 (62.8) | 528 (59.3) | 1,189 (61.2) | | 1,189 (61.2) |
| 血液透析濾過 (%) | 369 (35.1) | 334 (37.5) | 703 (36.2) | | 703 (36.2) |
| 血液濾過 (%) | | | | | |
| 血液吸着透析 (%) | 17 (1.6) | 26 (2.9) | 43 (2.2) | | 43 (2.2) |
| 在宅血液透析 (%) | 5 (0.5) | 2 (0.2) | 7 (0.4) | | 7 (0.4) |
| 腹膜透析 (%) | | 1 (0.1) | 1 (0.1) | | 1 (0.1) |
| 合計 (%) | 1,052 (100.0) | 891 (100.0) | 1,943 (100.0) | | 1,943 (100.0) |
| 記載なし | | | | | |
| 総計 | 1,052 | 891 | 1,943 | | 1,943 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##B0017##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査