

表 444 2000年導入患者治療方法 , 性別 (2016年末)

| 治療方法   | 男性      | 女性      | 合計      | 記載なし | 総計      |
|--------|---------|---------|---------|------|---------|
| 施設血液透析 | 1,975   | 1,413   | 3,388   |      | 3,388   |
| (%)    | (69.2)  | (69.7)  | (69.4)  |      | (69.4)  |
| 血液透析濾過 | 851     | 586     | 1,437   |      | 1,437   |
| (%)    | (29.8)  | (28.9)  | (29.4)  |      | (29.4)  |
| 血液濾過   | 1       |         | 1       |      | 1       |
| (%)    | (0.0)   |         | (0.0)   |      | (0.0)   |
| 血液吸着透析 | 7       | 8       | 15      |      | 15      |
| (%)    | (0.2)   | (0.4)   | (0.3)   |      | (0.3)   |
| 在宅血液透析 | 13      | 9       | 22      |      | 22      |
| (%)    | (0.5)   | (0.4)   | (0.5)   |      | (0.5)   |
| 腹膜透析   | 8       | 11      | 19      |      | 19      |
| (%)    | (0.3)   | (0.5)   | (0.4)   |      | (0.4)   |
| 合計     | 2,855   | 2,027   | 4,882   |      | 4,882   |
| (%)    | (100.0) | (100.0) | (100.0) |      | (100.0) |
| 記載なし   |         |         |         |      |         |
| 総計     | 2,855   | 2,027   | 4,882   |      | 4,882   |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##B0025##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査