

表 517 糖尿病の既往 原疾患別(透析患者全体)

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	60,962 (85.8)	10,127 (14.2)	71,089 (100.0)	81	20,613	91,783
慢性腎盂腎炎 (%)	1,939 (84.8)	348 (15.2)	2,287 (100.0)	1	608	2,896
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,485 (74.2)	517 (25.8)	2,002 (100.0)	3	533	2,538
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1,065 (90.3)	114 (9.7)	1,179 (100.0)	1	303	1,483
その他の分類不能の腎炎 (%)	936 (85.0)	165 (15.0)	1,101 (100.0)	2	351	1,454
多発性囊胞腎 (%)	8,117 (90.1)	890 (9.9)	9,007 (100.0)	11	2,453	11,471
腎硬化症 (%)	20,019 (80.2)	4,950 (19.8)	24,969 (100.0)	48	6,633	31,650
悪性高血圧 (%)	1,800 (84.8)	323 (15.2)	2,123 (100.0)	15	583	2,721
糖尿病性腎症 (%)	2 (0.0)	120,702 (100.0)	120,704 (100.0)	2	2,951	123,657
SLE腎炎 (%)	1,407 (81.0)	329 (19.0)	1,736 (100.0)	3	483	2,222
アミロイド腎 (%)	260 (76.7)	79 (23.3)	339 (100.0)		99	438
痛風腎 (%)	737 (87.4)	106 (12.6)	843 (100.0)	1	212	1,056
先天性代謝異常による腎不全 (%)	186 (81.9)	41 (18.1)	227 (100.0)		54	281
腎・尿路結核 (%)	117 (89.3)	14 (10.7)	131 (100.0)		37	168
腎・尿路結石 (%)	397 (83.9)	76 (16.1)	473 (100.0)		105	578
腎・尿路腫瘍 (%)	616 (81.4)	141 (18.6)	757 (100.0)	3	199	959
閉塞性尿路障害 (%)	503 (87.2)	74 (12.8)	577 (100.0)		166	743
骨髓腫 (%)	213 (81.0)	50 (19.0)	263 (100.0)	1	59	323
腎形成不全 (%)	479 (91.8)	43 (8.2)	522 (100.0)		142	664
不明 (%)	18,264 (75.6)	5,879 (24.4)	24,143 (100.0)	68	7,201	31,412
再導入 (%)	1,403 (80.4)	343 (19.6)	1,746 (100.0)	1	427	2,174
その他 (%)	4,870 (73.7)	1,736 (26.3)	6,606 (100.0)	15	1,817	8,438
合計 (%)	125,777 (46.1)	147,047 (53.9)	272,824 (100.0)	256	46,029	319,109
記載なし (%)						
総計 (%)	125,777 (46.1)	147,047 (53.9)	272,824 (100.0)	256	46,029	319,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D0016##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査