

表 522 糖尿病の既往 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	40,355 (85.6)	6,807 (14.4)	47,162 (100.0)	38	9,972	57,172
慢性腎孟腎炎 (%)	1,302 (83.5)	257 (16.5)	1,559 (100.0)	1	308	1,868
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,048 (73.0)	387 (27.0)	1,435 (100.0)	2	250	1,687
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	639 (89.9)	72 (10.1)	711 (100.0)	1	137	849
その他の分類不能の腎炎 (%)	605 (84.6)	110 (15.4)	715 (100.0)	1	186	902
多発性囊胞腎 (%)	5,641 (90.3)	605 (9.7)	6,246 (100.0)	5	1,297	7,548
腎硬化症 (%)	14,596 (80.9)	3,442 (19.1)	18,038 (100.0)	31	3,449	21,518
悪性高血圧 (%)	1,266 (85.1)	222 (14.9)	1,488 (100.0)	7	282	1,777
糖尿病性腎症 (%)	2 (0.0)	83,185 (100.0)	83,187 (100.0)	1	1,280	84,468
SLE腎炎 (%)	923 (80.9)	218 (19.1)	1,141 (100.0)	2	227	1,370
アミロイド腎 (%)	190 (79.5)	49 (20.5)	239 (100.0)		41	280
痛風腎 (%)	525 (86.9)	79 (13.1)	604 (100.0)	1	95	700
先天性代謝異常による腎不全 (%)	116 (80.6)	28 (19.4)	144 (100.0)		25	169
腎・尿路結核 (%)	79 (89.8)	9 (10.2)	88 (100.0)		18	106
腎・尿路結石 (%)	284 (83.8)	55 (16.2)	339 (100.0)		45	384
腎・尿路腫瘍 (%)	455 (82.9)	94 (17.1)	549 (100.0)	3	92	644
閉塞性尿路障害 (%)	338 (86.0)	55 (14.0)	393 (100.0)		72	465
骨髓腫 (%)	152 (80.9)	36 (19.1)	188 (100.0)	1	24	213
腎形成不全 (%)	284 (92.2)	24 (7.8)	308 (100.0)		60	368
不明 (%)	12,737 (75.8)	4,062 (24.2)	16,799 (100.0)	48	3,631	20,478
再導入 (%)	785 (77.3)	230 (22.7)	1,015 (100.0)	1	148	1,164
その他 (%)	3,389 (74.9)	1,135 (25.1)	4,524 (100.0)	12	870	5,406
合計 (%)	85,711 (45.9)	101,161 (54.1)	186,872 (100.0)	155	22,509	209,536
記載なし (%)						
総計 (%)	85,711 (45.9)	101,161 (54.1)	186,872 (100.0)	155	22,509	209,536

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D0023##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査