

表 527 糖尿病の既往 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	16,258 (87.8)	2,254 (12.2)	18,512 (100.0)	20	3,856	22,388
慢性腎孟腎炎 (%)	457 (87.5)	65 (12.5)	522 (100.0)		105	627
急速進行性糸球体腎炎 (%)	319 (79.4)	83 (20.6)	402 (100.0)	1	81	484
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	346 (91.1)	34 (8.9)	380 (100.0)		79	459
その他の分類不能の腎炎 (%)	259 (88.4)	34 (11.6)	293 (100.0)		62	355
多発性囊胞腎 (%)	1,959 (90.4)	209 (9.6)	2,168 (100.0)	1	400	2,569
腎硬化症 (%)	3,999 (80.1)	994 (19.9)	4,993 (100.0)	6	897	5,896
悪性高血圧 (%)	393 (85.4)	67 (14.6)	460 (100.0)	1	94	555
糖尿病性腎症 (%)		24,298 (100.0)	24,298 (100.0)		218	24,516
SLE腎炎 (%)	381 (83.6)	75 (16.4)	456 (100.0)		81	537
アミロイド腎 (%)	56 (69.1)	25 (30.9)	81 (100.0)		17	98
痛風腎 (%)	166 (89.7)	19 (10.3)	185 (100.0)		42	227
先天性代謝異常による腎不全 (%)	53 (85.5)	9 (14.5)	62 (100.0)		11	73
腎・尿路結核 (%)	34 (87.2)	5 (12.8)	39 (100.0)		5	44
腎・尿路結石 (%)	75 (83.3)	15 (16.7)	90 (100.0)		23	113
腎・尿路腫瘍 (%)	132 (81.5)	30 (18.5)	162 (100.0)		28	190
閉塞性尿路障害 (%)	114 (90.5)	12 (9.5)	126 (100.0)		25	151
骨髓腫 (%)	26 (83.9)	5 (16.1)	31 (100.0)		6	37
腎形成不全 (%)	136 (93.8)	9 (6.2)	145 (100.0)		26	171
不明 (%)	4,233 (77.9)	1,201 (22.1)	5,434 (100.0)	5	1,092	6,531
再導入 (%)	482 (86.8)	73 (13.2)	555 (100.0)		78	633
その他 (%)	1,064 (72.7)	400 (27.3)	1,464 (100.0)	1	255	1,720
合計 (%)	30,942 (50.8)	29,916 (49.2)	60,858 (100.0)	35	7,481	68,374
記載なし (%)						
総計 (%)	30,942 (50.8)	29,916 (49.2)	60,858 (100.0)	35	7,481	68,374

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D0033##