

表 539 心筋梗塞の既往 透析歴(年)別 (透析患者全体)

| 透析歴 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 2年未満 (%) | 47,914 (91.8) | 4,258 (8.2) | 52,172 (100.0) | 391 | 17,975 | 70,538 |
| 2年～ (%) | 52,950 (89.3) | 6,347 (10.7) | 59,297 (100.0) | 272 | 20,599 | 80,168 |
| 5年～ (%) | 51,952 (87.5) | 7,429 (12.5) | 59,381 (100.0) | 233 | 19,531 | 79,145 |
| 10年～ (%) | 27,111 (88.4) | 3,560 (11.6) | 30,671 (100.0) | 161 | 9,724 | 40,556 |
| 15年～ (%) | 15,092 (90.3) | 1,624 (9.7) | 16,716 (100.0) | 51 | 5,327 | 22,094 |
| 20年～ (%) | 8,612 (91.0) | 854 (9.0) | 9,466 (100.0) | 42 | 2,976 | 12,484 |
| 25年～ (%) | 4,743 (90.8) | 483 (9.2) | 5,226 (100.0) | 19 | 1,652 | 6,897 |
| 30年～ (%) | 2,730 (90.6) | 284 (9.4) | 3,014 (100.0) | 16 | 957 | 3,987 |
| 35年～ (%) | 1,517 (91.2) | 146 (8.8) | 1,663 (100.0) | 4 | 485 | 2,152 |
| 40年～ (%) | 551 (92.1) | 47 (7.9) | 598 (100.0) | 5 | 190 | 793 |
| 合計 (%) | 213,172 (89.5) | 25,032 (10.5) | 238,204 (100.0) | 1,194 | 79,416 | 318,814 |
| 不明 (%) | 62 (81.6) | 14 (18.4) | 76 (100.0) | 1 | 218 | 295 |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 213,234 (89.5) | 25,046 (10.5) | 238,280 (100.0) | 1,195 | 79,634 | 319,109 |
| 平均 | 7.41 | 7.52 | 7.42 | 6.32 | 7.16 | 7.35 |
| 標準偏差 | 7.69 | 7.14 | 7.63 | 7.53 | 7.50 | 7.60 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0115##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査