

表 555 心筋梗塞の既往 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,671	89	1,760	14	892	2,666
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	70	3	73		24	97
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	38	2	40		21	61
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	17	4	21		3	24
(%)	(81.0)	(19.0)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	49	2	51		24	75
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	161	9	170		102	272
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
腎硬化症	661	74	735	5	366	1,106
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
悪性高血圧	61	4	65		41	106
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
糖尿病性腎症	1,521	259	1,780	16	950	2,746
(%)	(85.4)	(14.6)	(100.0)			
SLE腎炎	32	1	33		22	55
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
アミロイド腎	9		9		7	16
(%)	(100.0)		(100.0)			
痛風腎	15	1	16		7	23
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	12		12		5	17
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結核					1	1
(%)						
腎・尿路結石	17		17		4	21
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路腫瘍	8		8		4	12
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	11	1	12		8	20
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
骨髄腫	3	2	5		2	7
(%)	(60.0)	(40.0)	(100.0)			
腎形成不全	45		45		20	65
(%)	(100.0)		(100.0)			
不明	500	37	537	6	346	889
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
再導入	34	4	38		27	65
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
その他	155	11	166	1	104	271
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
合計	5,090	503	5,593	42	2,980	8,615
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,090	503	5,593	42	2,980	8,615
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0143##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査