

表 561 脳出血の既往 年齢(歳)別 (透析患者全体)

| 年齢    | 既往なし    | 既往あり   | 合計      | 不明    | 記載なし   | 総計      |
|-------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|
| 15歳未満 | 62      | 5      | 67      |       | 26     | 93      |
| (%)   | (92.5)  | (7.5)  | (100.0) |       |        |         |
| 15歳～  | 640     | 12     | 652     | 3     | 256    | 911     |
| (%)   | (98.2)  | (1.8)  | (100.0) |       |        |         |
| 30歳～  | 9,634   | 345    | 9,979   | 34    | 3,409  | 13,422  |
| (%)   | (96.5)  | (3.5)  | (100.0) |       |        |         |
| 45歳～  | 39,983  | 2,624  | 42,607  | 164   | 14,573 | 57,344  |
| (%)   | (93.8)  | (6.2)  | (100.0) |       |        |         |
| 60歳～  | 97,560  | 7,808  | 105,368 | 465   | 35,796 | 141,629 |
| (%)   | (92.6)  | (7.4)  | (100.0) |       |        |         |
| 75歳～  | 68,849  | 4,527  | 73,376  | 399   | 25,838 | 99,613  |
| (%)   | (93.8)  | (6.2)  | (100.0) |       |        |         |
| 90歳～  | 4,245   | 229    | 4,474   | 26    | 1,595  | 6,095   |
| (%)   | (94.9)  | (5.1)  | (100.0) |       |        |         |
| 合計    | 220,973 | 15,550 | 236,523 | 1,091 | 81,493 | 319,107 |
| (%)   | (93.4)  | (6.6)  | (100.0) |       |        |         |
| 不明    |         |        |         |       |        |         |
| (%)   |         |        |         |       |        |         |
| 記載なし  |         |        |         |       | 2      | 2       |
| (%)   |         |        |         |       |        |         |
| 総計    | 220,973 | 15,550 | 236,523 | 1,091 | 81,495 | 319,109 |
| (%)   | (93.4)  | (6.6)  | (100.0) |       |        |         |
| 平均    | 68.06   | 68.59  | 68.10   | 69.75 | 68.26  | 68.15   |
| 標準偏差  | 12.57   | 10.95  | 12.47   | 12.21 | 12.53  | 12.48   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0214##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査