

表 568 脳出血の既往 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	42,466 (93.2)	3,095 (6.8)	45,561 (100.0)	160	11,451	57,172
慢性腎孟腎炎 (%)	1,392 (93.1)	103 (6.9)	1,495 (100.0)	8	365	1,868
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,316 (96.1)	53 (3.9)	1,369 (100.0)	8	310	1,687
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	632 (92.4)	52 (7.6)	684 (100.0)	5	160	849
その他の分類不能の腎炎 (%)	643 (95.0)	34 (5.0)	677 (100.0)	3	222	902
多発性囊胞腎 (%)	5,332 (86.7)	819 (13.3)	6,151 (100.0)	23	1,374	7,548
腎硬化症 (%)	16,125 (92.5)	1,309 (7.5)	17,434 (100.0)	75	4,009	21,518
悪性高血圧 (%)	1,312 (91.7)	118 (8.3)	1,430 (100.0)	15	332	1,777
糖尿病性腎症 (%)	63,256 (94.2)	3,865 (5.8)	67,121 (100.0)	298	17,049	84,468
SLE腎炎 (%)	1,037 (94.4)	61 (5.6)	1,098 (100.0)	4	268	1,370
アミロイド腎 (%)	222 (97.4)	6 (2.6)	228 (100.0)	1	51	280
痛風腎 (%)	562 (94.9)	30 (5.1)	592 (100.0)	2	106	700
先天性代謝異常による腎不全 (%)	129 (94.2)	8 (5.8)	137 (100.0)		32	169
腎・尿路結核 (%)	74 (91.4)	7 (8.6)	81 (100.0)		25	106
腎・尿路結石 (%)	305 (92.4)	25 (7.6)	330 (100.0)	3	51	384
腎・尿路腫瘍 (%)	500 (95.2)	25 (4.8)	525 (100.0)	4	115	644
閉塞性尿路障害 (%)	361 (94.5)	21 (5.5)	382 (100.0)		83	465
骨髓腫 (%)	176 (97.8)	4 (2.2)	180 (100.0)	1	32	213
腎形成不全 (%)	285 (95.3)	14 (4.7)	299 (100.0)	1	68	368
不明 (%)	14,614 (92.2)	1,231 (7.8)	15,845 (100.0)	108	4,525	20,478
再導入 (%)	915 (96.0)	38 (4.0)	953 (100.0)	4	207	1,164
その他 (%)	3,920 (93.7)	265 (6.3)	4,185 (100.0)	31	1,190	5,406
合計 (%)	155,574 (93.3)	11,183 (6.7)	166,757 (100.0)	754	42,025	209,536
記載なし (%)						
総計 (%)	155,574 (93.3)	11,183 (6.7)	166,757 (100.0)	754	42,025	209,536

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D0223##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査