

表 578 脳出血の既往 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,689	67	1,756	13	897	2,666
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	70	3	73		24	97
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	39	3	42		19	61
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	21		21		3	24
(%)	(100.0)		(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	46	4	50		25	75
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	163	7	170	1	101	272
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
腎硬化症	695	38	733	5	368	1,106
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
悪性高血圧	61	6	67		39	106
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
糖尿病性腎症	1,663	83	1,746	16	984	2,746
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
SLE腎炎	30	2	32		23	55
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
アミロイド腎	9		9		7	16
(%)	(100.0)		(100.0)			
痛風腎	16		16		7	23
(%)	(100.0)		(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	12		12		5	17
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結核					1	1
(%)						
腎・尿路結石	14	3	17		4	21
(%)	(82.4)	(17.6)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	8		8		4	12
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	12		12		8	20
(%)	(100.0)		(100.0)			
骨髄腫	3	1	4		3	7
(%)	(75.0)	(25.0)	(100.0)			
腎形成不全	43	2	45		20	65
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
不明	512	26	538	6	345	889
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
再導入	35	4	39		26	65
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
その他	157	6	163	1	107	271
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
合計	5,298	255	5,553	42	3,020	8,615
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,298	255	5,553	42	3,020	8,615
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0243##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査