

表 596 脳梗塞の既往 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

| 原疾患 | 既往なし | 既往あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----|--------|--------|
| 慢性糸球体腎炎 (%) | 15,565 (85.6) | 2,616 (14.4) | 18,181 (100.0) | 60 | 4,147 | 22,388 |
| 慢性腎孟腎炎 (%) | 437 (85.9) | 72 (14.1) | 509 (100.0) | 1 | 117 | 627 |
| 急速進行性糸球体腎炎 (%) | 343 (89.1) | 42 (10.9) | 385 (100.0) | 1 | 98 | 484 |
| 妊娠腎/妊娠中毒症 (%) | 317 (83.9) | 61 (16.1) | 378 (100.0) | | 81 | 459 |
| その他の分類不能の腎炎 (%) | 256 (91.4) | 24 (8.6) | 280 (100.0) | | 75 | 355 |
| 多発性囊胞腎 (%) | 1,846 (86.6) | 285 (13.4) | 2,131 (100.0) | 6 | 432 | 2,569 |
| 腎硬化症 (%) | 3,940 (80.8) | 935 (19.2) | 4,875 (100.0) | 23 | 998 | 5,896 |
| 悪性高血圧 (%) | 397 (87.1) | 59 (12.9) | 456 (100.0) | 2 | 97 | 555 |
| 糖尿病性腎症 (%) | 15,714 (78.4) | 4,328 (21.6) | 20,042 (100.0) | 79 | 4,395 | 24,516 |
| SLE腎炎 (%) | 401 (89.7) | 46 (10.3) | 447 (100.0) | 3 | 87 | 537 |
| アミロイド腎 (%) | 72 (92.3) | 6 (7.7) | 78 (100.0) | 1 | 19 | 98 |
| 痛風腎 (%) | 156 (86.2) | 25 (13.8) | 181 (100.0) | 2 | 44 | 227 |
| 先天性代謝異常による腎不全 (%) | 57 (93.4) | 4 (6.6) | 61 (100.0) | | 12 | 73 |
| 腎・尿路結核 (%) | 30 (78.9) | 8 (21.1) | 38 (100.0) | | 6 | 44 |
| 腎・尿路結石 (%) | 73 (82.0) | 16 (18.0) | 89 (100.0) | 1 | 23 | 113 |
| 腎・尿路腫瘍 (%) | 143 (90.5) | 15 (9.5) | 158 (100.0) | | 32 | 190 |
| 閉塞性尿路障害 (%) | 111 (90.2) | 12 (9.8) | 123 (100.0) | | 28 | 151 |
| 骨髓腫 (%) | 29 (100.0) | | 29 (100.0) | | 8 | 37 |
| 腎形成不全 (%) | 135 (95.1) | 7 (4.9) | 142 (100.0) | | 29 | 171 |
| 不明 (%) | 4,351 (84.3) | 812 (15.7) | 5,163 (100.0) | 14 | 1,354 | 6,531 |
| 再導入 (%) | 491 (90.9) | 49 (9.1) | 540 (100.0) | 1 | 92 | 633 |
| その他 (%) | 1,175 (84.3) | 219 (15.7) | 1,394 (100.0) | 3 | 323 | 1,720 |
| 合計 (%) | 46,039 (82.7) | 9,641 (17.3) | 55,680 (100.0) | 197 | 12,497 | 68,374 |
| 記載なし (%) | | | | | | |
| 総計 (%) | 46,039 (82.7) | 9,641 (17.3) | 55,680 (100.0) | 197 | 12,497 | 68,374 |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D0333##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査