

表 601 脳梗塞の既往 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,618	156	1,774	13	879	2,666
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	66	8	74	1	22	97
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	37	3	40		21	61
(%)	(92.5)	(7.5)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	19	2	21		3	24
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	49	2	51		24	75
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	157	16	173	1	98	272
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
腎硬化症	637	109	746	5	355	1,106
(%)	(85.4)	(14.6)	(100.0)			
悪性高血圧	58	8	66		40	106
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
糖尿病性腎症	1,496	301	1,797	16	933	2,746
(%)	(83.2)	(16.8)	(100.0)			
SLE腎炎	28	7	35		20	55
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
アミロイド腎	7	2	9		7	16
(%)	(77.8)	(22.2)	(100.0)			
痛風腎	16		16		7	23
(%)	(100.0)		(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	10	2	12		5	17
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
腎・尿路結核					1	1
(%)						
腎・尿路結石	14	3	17		4	21
(%)	(82.4)	(17.6)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	6	2	8		4	12
(%)	(75.0)	(25.0)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	12	1	13		7	20
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
骨髄腫	4	1	5		2	7
(%)	(80.0)	(20.0)	(100.0)			
腎形成不全	44	1	45		20	65
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
不明	478	65	543	5	341	889
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
再導入	34	5	39		26	65
(%)	(87.2)	(12.8)	(100.0)			
その他	156	7	163	1	107	271
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
合計	4,946	701	5,647	42	2,926	8,615
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	4,946	701	5,647	42	2,926	8,615
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0343##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査