

表 607 四肢切断の有無 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	67		67		26	93
(%)	(100.0)		(100.0)			
15歳～	652	3	655	2	254	911
(%)	(99.5)	(0.5)	(100.0)			
30歳～	9,797	268	10,065	14	3,343	13,422
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
45歳～	41,000	2,026	43,026	57	14,261	57,344
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
60歳～	101,289	4,769	106,058	164	35,407	141,629
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
75歳～	71,725	2,175	73,900	149	25,564	99,613
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
90歳～	4,422	85	4,507	12	1,576	6,095
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
合計	228,952	9,326	238,278	398	80,431	319,107
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
不明						
(%)						
記載なし					2	2
(%)						
総計	228,952	9,326	238,278	398	80,433	319,109
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
平均	68.15	66.63	68.09	69.88	68.30	68.15
標準偏差	12.53	10.92	12.47	12.54	12.52	12.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0414##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査