

表 613 四肢切断の有無 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析歴	切斷なし	切斷あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	37,916 (97.6)	924 (2.4)	38,840 (100.0)	106	9,305	48,251
2年～ (%)	40,891 (96.5)	1,493 (3.5)	42,384 (100.0)	55	10,923	53,362
5年～ (%)	40,116 (94.8)	2,192 (5.2)	42,308 (100.0)	47	10,369	52,724
10年～ (%)	20,310 (94.3)	1,234 (5.7)	21,544 (100.0)	44	5,119	26,707
15年～ (%)	10,776 (95.5)	507 (4.5)	11,283 (100.0)	6	2,659	13,948
20年～ (%)	5,747 (97.0)	179 (3.0)	5,926 (100.0)	9	1,416	7,351
25年～ (%)	2,914 (97.7)	69 (2.3)	2,983 (100.0)	7	733	3,723
30年～ (%)	1,554 (97.3)	43 (2.7)	1,597 (100.0)	2	370	1,969
35年～ (%)	792 (95.8)	35 (4.2)	827 (100.0)		169	996
40年～ (%)	274 (95.5)	13 (4.5)	287 (100.0)	1	65	353
合計 (%)	161,290 (96.0)	6,689 (4.0)	167,979 (100.0)	277	41,128	209,384
不明 (%)	61 (96.8)	2 (3.2)	63 (100.0)		89	152
記載なし (%)						
総計 (%)	161,351 (96.0)	6,691 (4.0)	168,042 (100.0)	277	41,217	209,536
平均	6.93	7.73	6.97	5.76	6.85	6.94
標準偏差	7.19	6.50	7.16	7.14	7.03	7.14

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0422##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査