

表 614 四肢切断の有無 原疾患別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

原疾患	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	45,015 (98.5)	700 (1.5)	45,715 (100.0)	66	11,391	57,172
慢性腎孟腎炎 (%)	1,481 (98.5)	22 (1.5)	1,503 (100.0)	2	363	1,868
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,364 (98.7)	18 (1.3)	1,382 (100.0)	3	302	1,687
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	673 (98.1)	13 (1.9)	686 (100.0)	4	159	849
その他の分類不能の腎炎 (%)	669 (99.0)	7 (1.0)	676 (100.0)	3	223	902
多発性囊胞腎 (%)	6,045 (99.0)	58 (1.0)	6,103 (100.0)	8	1,437	7,548
腎硬化症 (%)	17,203 (98.7)	234 (1.3)	17,437 (100.0)	26	4,055	21,518
悪性高血圧 (%)	1,415 (98.6)	20 (1.4)	1,435 (100.0)	11	331	1,777
糖尿病性腎症 (%)	62,984 (92.6)	5,055 (7.4)	68,039 (100.0)	117	16,312	84,468
SLE腎炎 (%)	1,073 (96.8)	36 (3.2)	1,109 (100.0)	1	260	1,370
アミロイド腎 (%)	230 (99.6)	1 (0.4)	231 (100.0)		49	280
痛風腎 (%)	587 (98.7)	8 (1.3)	595 (100.0)		105	700
先天性代謝異常による腎不全 (%)	135 (97.8)	3 (2.2)	138 (100.0)		31	169
腎・尿路結核 (%)	78 (98.7)	1 (1.3)	79 (100.0)		27	106
腎・尿路結石 (%)	325 (98.5)	5 (1.5)	330 (100.0)		54	384
腎・尿路腫瘍 (%)	518 (98.1)	10 (1.9)	528 (100.0)	2	114	644
閉塞性尿路障害 (%)	371 (96.6)	13 (3.4)	384 (100.0)		81	465
骨髓腫 (%)	182 (100.0)		182 (100.0)	2	29	213
腎形成不全 (%)	296 (98.3)	5 (1.7)	301 (100.0)		67	368
不明 (%)	15,616 (97.7)	360 (2.3)	15,976 (100.0)	17	4,485	20,478
再導入 (%)	936 (97.0)	29 (3.0)	965 (100.0)	1	198	1,164
その他 (%)	4,155 (97.8)	93 (2.2)	4,248 (100.0)	14	1,144	5,406
合計 (%)	161,351 (96.0)	6,691 (4.0)	168,042 (100.0)	277	41,217	209,536
記載なし (%)						
総計 (%)	161,351 (96.0)	6,691 (4.0)	168,042 (100.0)	277	41,217	209,536

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

#D0423##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査