

表 618 四肢切断の有無 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	切斷なし	切斷あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	8,013	192	8,205	2	1,811	10,018
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
2年～	12,393	437	12,830		3,108	15,938
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
5年～	13,556	639	14,195	4	3,383	17,582
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
10年～	7,754	420	8,174	3	1,939	10,116
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
15年～	4,755	169	4,924	2	1,132	6,058
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
20年～	3,060	76	3,136	5	716	3,857
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
25年～	1,859	27	1,886		459	2,345
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
30年～	1,074	24	1,098	1	268	1,367
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
35年～	626	10	636		144	780
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
40年～	224	9	233		54	287
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
合計	53,314	2,003	55,317	17	13,014	68,348
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
不明	9		9		17	26
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	53,323	2,003	55,326	17	13,031	68,374
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
平均	9.15	8.71	9.14	13.71	9.13	9.14
標準偏差	8.53	6.97	8.48	8.55	8.45	8.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0432##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査