

表 619 四肢切断の有無 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	17,888 (98.7)	231 (1.3)	18,119 (100.0)	4	4,265	22,388
慢性腎孟腎炎 (%)	498 (97.5)	13 (2.5)	511 (100.0)		116	627
急速進行性糸球体腎炎 (%)	382 (99.2)	3 (0.8)	385 (100.0)		99	484
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	363 (98.6)	5 (1.4)	368 (100.0)		91	459
その他の分類不能の腎炎 (%)	278 (99.6)	1 (0.4)	279 (100.0)		76	355
多発性囊胞腎 (%)	2,100 (99.3)	15 (0.7)	2,115 (100.0)	1	453	2,569
腎硬化症 (%)	4,746 (98.7)	62 (1.3)	4,808 (100.0)		1,088	5,896
悪性高血圧 (%)	445 (98.7)	6 (1.3)	451 (100.0)		104	555
糖尿病性腎症 (%)	18,372 (92.4)	1,507 (7.6)	19,879 (100.0)	9	4,628	24,516
SLE腎炎 (%)	438 (99.1)	4 (0.9)	442 (100.0)	1	94	537
アミロイド腎 (%)	77 (100.0)		77 (100.0)	1	20	98
痛風腎 (%)	181 (97.8)	4 (2.2)	185 (100.0)		42	227
先天性代謝異常による腎不全 (%)	60 (100.0)		60 (100.0)		13	73
腎・尿路結核 (%)	38 (100.0)		38 (100.0)		6	44
腎・尿路結石 (%)	86 (98.9)	1 (1.1)	87 (100.0)		26	113
腎・尿路腫瘍 (%)	154 (98.7)	2 (1.3)	156 (100.0)		34	190
閉塞性尿路障害 (%)	120 (98.4)	2 (1.6)	122 (100.0)		29	151
骨髓腫 (%)	29 (100.0)		29 (100.0)		8	37
腎形成不全 (%)	141 (99.3)	1 (0.7)	142 (100.0)		29	171
不明 (%)	5,071 (98.2)	92 (1.8)	5,163 (100.0)		1,368	6,531
再導入 (%)	527 (98.0)	11 (2.0)	538 (100.0)		95	633
その他 (%)	1,329 (96.9)	43 (3.1)	1,372 (100.0)	1	347	1,720
合計 (%)	53,323 (96.4)	2,003 (3.6)	55,326 (100.0)	17	13,031	68,374
記載なし (%)						
総計 (%)	53,323 (96.4)	2,003 (3.6)	55,326 (100.0)	17	13,031	68,374

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D0433##