

表 624 四肢切断の有無 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,741	12	1,753	12	901	2,666
(%)	(99.3)	(0.7)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	73	1	74		23	97
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	39	1	40		21	61
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	21		21		3	24
(%)	(100.0)		(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	50		50		25	75
(%)	(100.0)		(100.0)			
多発性嚢胞腎	168	1	169	1	102	272
(%)	(99.4)	(0.6)	(100.0)			
腎硬化症	730	4	734	5	367	1,106
(%)	(99.5)	(0.5)	(100.0)			
悪性高血圧	64	1	65		41	106
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
糖尿病性腎症	1,701	54	1,755	16	975	2,746
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
SLE腎炎	32		32		23	55
(%)	(100.0)		(100.0)			
アミロイド腎	9		9		7	16
(%)	(100.0)		(100.0)			
痛風腎	16		16		7	23
(%)	(100.0)		(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	12		12		5	17
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結核					1	1
(%)						
腎・尿路結石	17		17		4	21
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路腫瘍	9		9		3	12
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	12		12		8	20
(%)	(100.0)		(100.0)			
骨髄腫	4		4		3	7
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎形成不全	45		45		20	65
(%)	(100.0)		(100.0)			
不明	530	4	534	6	349	889
(%)	(99.3)	(0.7)	(100.0)			
再導入	38		38		27	65
(%)	(100.0)		(100.0)			
その他	161	2	163	1	107	271
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
合計	5,472	80	5,552	41	3,022	8,615
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	5,472	80	5,552	41	3,022	8,615
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0443##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査