

表 628 大腿骨近位部骨折の既往 併用の状況別 (透析患者全体)

併用の状況	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	219,217 (95.0)	11,504 (5.0)	230,721 (100.0)	716	78,701	310,138
PD単独 (%)	4,237 (97.2)	120 (2.8)	4,357 (100.0)	40	2,534	6,931
HD(F)単独.PDカテあり (%)	136 (97.1)	4 (2.9)	140 (100.0)		37	177
PD.HD併用週1HD(F) (%)	1,025 (98.3)	18 (1.7)	1,043 (100.0)	3	450	1,496
PD.HD併用週2HD(F) (%)	124 (98.4)	2 (1.6)	126 (100.0)	2	37	165
PD.HD併用週3HD(F) (%)	28 (100.0)		28 (100.0)	3	6	37
PD.HD併用週4HD(F) (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
PD.HD併用その他 (%)	42 (97.7)	1 (2.3)	43 (100.0)		20	63
合計 (%)	224,810 (95.1)	11,649 (4.9)	236,459 (100.0)	764	81,785	319,008
不明 (%)	16 (100.0)		16 (100.0)	3	3	22
記載なし (%)					79	79
総計 (%)	224,826 (95.1)	11,649 (4.9)	236,475 (100.0)	767	81,867	319,109

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D0512##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査