

表 630 大腿骨近位部骨折の既往 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	67 (100.0)		67 (100.0)		26	93
15歳～ (%)	644 (99.2)	5 (0.8)	649 (100.0)	3	259	911
30歳～ (%)	9,850 (98.8)	123 (1.2)	9,973 (100.0)	25	3,424	13,422
45歳～ (%)	41,557 (97.9)	872 (2.1)	42,429 (100.0)	117	14,798	57,344
60歳～ (%)	100,904 (96.1)	4,116 (3.9)	105,020 (100.0)	349	36,260	141,629
75歳～ (%)	67,911 (92.0)	5,876 (8.0)	73,787 (100.0)	260	25,566	99,613
90歳～ (%)	3,893 (85.6)	657 (14.4)	4,550 (100.0)	13	1,532	6,095
合計 (%)	224,826 (95.1)	11,649 (4.9)	236,475 (100.0)	767	81,865	319,107
不明 (%)						
記載なし (%)					2	2
総計 (%)	224,826 (95.1)	11,649 (4.9)	236,475 (100.0)	767	81,867	319,109
平均	67.79	74.94	68.14	69.24	68.14	68.15
標準偏差	12.46	10.81	12.48	12.16	12.49	12.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0514##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査