

表 631 大腿骨近位部骨折の既往 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	50,221 (96.8)	1,681 (3.2)	51,902 (100.0)	281	18,355	70,538
2年～ (%)	55,981 (95.2)	2,808 (4.8)	58,789 (100.0)	162	21,217	80,168
5年～ (%)	55,368 (94.3)	3,348 (5.7)	58,716 (100.0)	145	20,284	79,145
10年～ (%)	28,684 (94.2)	1,761 (5.8)	30,445 (100.0)	95	10,016	40,556
15年～ (%)	15,788 (94.9)	854 (5.1)	16,642 (100.0)	28	5,424	22,094
20年～ (%)	8,977 (95.3)	443 (4.7)	9,420 (100.0)	25	3,039	12,484
25年～ (%)	4,930 (94.7)	277 (5.3)	5,207 (100.0)	14	1,676	6,897
30年～ (%)	2,787 (92.9)	214 (7.1)	3,001 (100.0)	6	980	3,987
35年～ (%)	1,506 (90.2)	164 (9.8)	1,670 (100.0)	5	477	2,152
40年～ (%)	517 (85.0)	91 (15.0)	608 (100.0)	4	181	793
合計 (%)	224,759 (95.1)	11,641 (4.9)	236,400 (100.0)	765	81,649	318,814
不明 (%)	67 (89.3)	8 (10.7)	75 (100.0)	2	218	295
記載なし (%)						
総計 (%)	224,826 (95.1)	11,649 (4.9)	236,475 (100.0)	767	81,867	319,109
平均	7.36	8.66	7.43	6.00	7.13	7.35
標準偏差	7.61	8.37	7.65	7.52	7.45	7.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0515##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査