

表 632 大腿骨近位部骨折の既往 原疾患別 (透析患者全体)

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	65,224 (95.7)	2,966 (4.3)	68,190 (100.0)	156	23,437	91,783
慢性腎盂腎炎 (%)	2,066 (94.3)	126 (5.7)	2,192 (100.0)	8	696	2,896
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,806 (95.3)	89 (4.7)	1,895 (100.0)	5	638	2,538
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	1,064 (93.5)	74 (6.5)	1,138 (100.0)	7	338	1,483
その他の分類不能の腎炎 (%)	982 (94.5)	57 (5.5)	1,039 (100.0)	5	410	1,454
多発性囊胞腎 (%)	8,425 (96.7)	292 (3.3)	8,717 (100.0)	21	2,733	11,471
腎硬化症 (%)	22,571 (94.5)	1,305 (5.5)	23,876 (100.0)	61	7,713	31,650
悪性高血圧 (%)	1,955 (96.9)	62 (3.1)	2,017 (100.0)	26	678	2,721
糖尿病性腎症 (%)	86,780 (94.7)	4,824 (5.3)	91,604 (100.0)	306	31,747	123,657
SLE腎炎 (%)	1,545 (92.5)	125 (7.5)	1,670 (100.0)	6	546	2,222
アミロイド腎 (%)	300 (92.3)	25 (7.7)	325 (100.0)	2	111	438
痛風腎 (%)	790 (96.2)	31 (3.8)	821 (100.0)	3	232	1,056
先天性代謝異常による腎不全 (%)	205 (95.8)	9 (4.2)	214 (100.0)	1	66	281
腎・尿路結核 (%)	111 (91.7)	10 (8.3)	121 (100.0)		47	168
腎・尿路結石 (%)	438 (96.1)	18 (3.9)	456 (100.0)	3	119	578
腎・尿路腫瘍 (%)	694 (97.5)	18 (2.5)	712 (100.0)	2	245	959
閉塞性尿路障害 (%)	532 (95.5)	25 (4.5)	557 (100.0)	1	185	743
骨髓腫 (%)	236 (95.5)	11 (4.5)	247 (100.0)	1	75	323
腎形成不全 (%)	495 (98.2)	9 (1.8)	504 (100.0)		160	664
不明 (%)	21,228 (94.5)	1,227 (5.5)	22,455 (100.0)	120	8,837	31,412
再導入 (%)	1,572 (95.9)	68 (4.1)	1,640 (100.0)	4	530	2,174
その他 (%)	5,807 (95.4)	278 (4.6)	6,085 (100.0)	29	2,324	8,438
合計 (%)	224,826 (95.1)	11,649 (4.9)	236,475 (100.0)	767	81,867	319,109
記載なし (%)						
総計 (%)	224,826 (95.1)	11,649 (4.9)	236,475 (100.0)	767	81,867	319,109

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D0516##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査