

表 635 大腿骨近位部骨折の既往 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	4 (100.0)		4 (100.0)		1	5
15歳~ (%)	376 (98.9)	4 (1.1)	380 (100.0)	2	114	496
30歳~ (%)	6,158 (98.6)	86 (1.4)	6,244 (100.0)	16	1,554	7,814
45歳~ (%)	26,678 (97.8)	587 (2.2)	27,265 (100.0)	94	7,133	34,492
60歳~ (%)	70,595 (96.0)	2,923 (4.0)	73,518 (100.0)	272	18,592	92,382
75歳~ (%)	51,331 (91.9)	4,511 (8.1)	55,842 (100.0)	199	13,983	70,024
90歳~ (%)	3,006 (85.6)	507 (14.4)	3,513 (100.0)	9	799	4,321
合計 (%)	158,148 (94.8)	8,618 (5.2)	166,766 (100.0)	592	42,176	209,534
不明 (%)						
記載なし (%)					2	2
総計 (%)	158,148 (94.8)	8,618 (5.2)	166,766 (100.0)	592	42,178	209,536
平均	68.61	75.41	68.96	69.33	68.78	68.93
標準偏差	12.25	10.68	12.27	11.99	12.24	12.26

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D0521##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査