

表 636 大腿骨近位部骨折の既往 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年末満 (%)	37,203 (96.6)	1,300 (3.4)	38,503 (100.0)	192	9,556	48,251
2年～ (%)	39,954 (95.0)	2,098 (5.0)	42,052 (100.0)	131	11,179	53,362
5年～ (%)	39,403 (94.0)	2,536 (6.0)	41,939 (100.0)	117	10,668	52,724
10年～ (%)	20,065 (93.8)	1,336 (6.2)	21,401 (100.0)	84	5,222	26,707
15年～ (%)	10,610 (94.5)	612 (5.5)	11,222 (100.0)	24	2,702	13,948
20年～ (%)	5,590 (94.9)	302 (5.1)	5,892 (100.0)	21	1,438	7,351
25年～ (%)	2,817 (94.3)	171 (5.7)	2,988 (100.0)	10	725	3,723
30年～ (%)	1,472 (92.2)	125 (7.8)	1,597 (100.0)	4	368	1,969
35年～ (%)	742 (89.8)	84 (10.2)	826 (100.0)	4	166	996
40年～ (%)	240 (83.0)	49 (17.0)	289 (100.0)	3	61	353
合計 (%)	158,096 (94.8)	8,613 (5.2)	166,709 (100.0)	590	42,085	209,384
不明 (%)	52 (91.2)	5 (8.8)	57 (100.0)	2	93	152
記載なし (%)						
総計 (%)	158,148 (94.8)	8,618 (5.2)	166,766 (100.0)	592	42,178	209,536
平均	6.91	8.16	6.98	6.36	6.80	6.94
標準偏差	7.14	7.76	7.17	7.45	6.98	7.14

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0522##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査