

表 640 大腿骨近位部骨折の既往 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)						
15歳～ (%)	180 (99.4)	1 (0.6)	181 (100.0)		53	234
30歳～ (%)	2,923 (99.0)	30 (1.0)	2,953 (100.0)	3	733	3,689
45歳～ (%)	11,883 (98.1)	227 (1.9)	12,110 (100.0)	10	2,914	15,034
60歳～ (%)	24,297 (96.5)	881 (3.5)	25,178 (100.0)	22	6,129	31,329
75歳～ (%)	12,848 (92.9)	986 (7.1)	13,834 (100.0)	15	3,380	17,229
90歳～ (%)	593 (86.2)	95 (13.8)	688 (100.0)	1	170	859
合計 (%)	52,724 (96.0)	2,220 (4.0)	54,944 (100.0)	51	13,379	68,374
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	52,724 (96.0)	2,220 (4.0)	54,944 (100.0)	51	13,379	68,374
平均	65.77	73.10	66.06	66.73	66.08	66.07
標準偏差	12.44	11.12	12.47	13.54	12.47	12.47

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##D0531##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査