

表 641 大腿骨近位部骨折の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年末満 (%)	7,931 (97.4)	211 (2.6)	8,142 (100.0)	10	1,866	10,018
2年～ (%)	12,270 (96.2)	480 (3.8)	12,750 (100.0)	5	3,183	15,938
5年～ (%)	13,443 (95.5)	633 (4.5)	14,076 (100.0)	16	3,490	17,582
10年～ (%)	7,745 (95.6)	360 (4.4)	8,105 (100.0)	7	2,004	10,116
15年～ (%)	4,699 (95.9)	200 (4.1)	4,899 (100.0)	3	1,156	6,058
20年～ (%)	3,017 (96.2)	118 (3.8)	3,135 (100.0)	4	718	3,857
25年～ (%)	1,799 (95.9)	77 (4.1)	1,876 (100.0)	3	466	2,345
30年～ (%)	1,026 (94.3)	62 (5.7)	1,088 (100.0)	1	278	1,367
35年～ (%)	583 (92.5)	47 (7.5)	630 (100.0)	1	149	780
40年～ (%)	204 (87.2)	30 (12.8)	234 (100.0)	1	52	287
合計 (%)	52,717 (96.0)	2,218 (4.0)	54,935 (100.0)	51	13,362	68,348
不明 (%)	7 (77.8)	2 (22.2)	9 (100.0)		17	26
記載なし (%)						
総計 (%)	52,724 (96.0)	2,220 (4.0)	54,944 (100.0)	51	13,379	68,374
平均	9.09	10.45	9.14	10.51	9.10	9.14
標準偏差	8.44	9.38	8.49	10.07	8.42	8.47

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0532##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査