

表 642 大腿骨近位部骨折の既往 原疾患別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	17,381 (96.4)	649 (3.6)	18,030 (100.0)	19	4,339	22,388
慢性腎孟腎炎 (%)	482 (94.5)	28 (5.5)	510 (100.0)		117	627
急速進行性糸球体腎炎 (%)	370 (96.9)	12 (3.1)	382 (100.0)		102	484
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	344 (93.5)	24 (6.5)	368 (100.0)		91	459
その他の分類不能の腎炎 (%)	270 (96.8)	9 (3.2)	279 (100.0)		76	355
多発性囊胞腎 (%)	2,042 (96.8)	67 (3.2)	2,109 (100.0)	2	458	2,569
腎硬化症 (%)	4,562 (95.2)	232 (4.8)	4,794 (100.0)	4	1,098	5,896
悪性高血圧 (%)	440 (97.3)	12 (2.7)	452 (100.0)		103	555
糖尿病性腎症 (%)	18,828 (95.7)	852 (4.3)	19,680 (100.0)	17	4,819	24,516
SLE腎炎 (%)	417 (93.7)	28 (6.3)	445 (100.0)	1	91	537
アミロイド腎 (%)	75 (97.4)	2 (2.6)	77 (100.0)	1	20	98
痛風腎 (%)	178 (97.3)	5 (2.7)	183 (100.0)		44	227
先天性代謝異常による腎不全 (%)	57 (95.0)	3 (5.0)	60 (100.0)		13	73
腎・尿路結核 (%)	38 (100.0)		38 (100.0)		6	44
腎・尿路結石 (%)	82 (95.3)	4 (4.7)	86 (100.0)		27	113
腎・尿路腫瘍 (%)	154 (99.4)	1 (0.6)	155 (100.0)		35	190
閉塞性尿路障害 (%)	116 (97.5)	3 (2.5)	119 (100.0)		32	151
骨髓腫 (%)	28 (93.3)	2 (6.7)	30 (100.0)		7	37
腎形成不全 (%)	140 (99.3)	1 (0.7)	141 (100.0)		30	171
不明 (%)	4,882 (95.7)	220 (4.3)	5,102 (100.0)	5	1,424	6,531
再導入 (%)	515 (96.3)	20 (3.7)	535 (100.0)	1	97	633
その他 (%)	1,323 (96.6)	46 (3.4)	1,369 (100.0)	1	350	1,720
合計 (%)	52,724 (96.0)	2,220 (4.0)	54,944 (100.0)	51	13,379	68,374
記載なし (%)						
総計 (%)	52,724 (96.0)	2,220 (4.0)	54,944 (100.0)	51	13,379	68,374

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D0533##