

表 643 大腿骨近位部骨折の既往 医療機関別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

医療機関	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学 (%)	39 (97.5)	1 (2.5)	40 (100.0)		14	54
私立大学 (%)	181 (96.3)	7 (3.7)	188 (100.0)	1	48	237
国立病院機構等 (%)	49 (96.1)	2 (3.9)	51 (100.0)		4	55
県市町村立・国保 (%)	1,775 (95.1)	92 (4.9)	1,867 (100.0)	1	690	2,558
JCHO(旧社会保険)等 (%)	405 (94.8)	22 (5.2)	427 (100.0)		99	526
厚生連等 (%)	917 (95.9)	39 (4.1)	956 (100.0)		515	1,471
その他公的 (%)	784 (96.2)	31 (3.8)	815 (100.0)		267	1,082
私立総合 (%)	1,055 (94.8)	58 (5.2)	1,113 (100.0)		352	1,465
私立 (%)	13,895 (94.8)	767 (5.2)	14,662 (100.0)	35	3,308	18,005
私立診療所 (%)	33,624 (96.6)	1,201 (3.4)	34,825 (100.0)	14	8,082	42,921
総計 (%)	52,724 (96.0)	2,220 (4.0)	54,944 (100.0)	51	13,379	68,374

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0534##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2016年調査