

表 645 大腿骨近位部骨折の既往 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	62 (100.0)		62 (100.0)		23	85
15歳～ (%)	63 (100.0)		63 (100.0)		31	94
30歳～ (%)	379 (100.0)		379 (100.0)	6	223	608
45歳～ (%)	1,436 (99.1)	13 (0.9)	1,449 (100.0)	7	827	2,283
60歳～ (%)	2,346 (97.8)	53 (2.2)	2,399 (100.0)	18	1,301	3,718
75歳～ (%)	1,034 (94.2)	64 (5.8)	1,098 (100.0)	11	592	1,701
90歳～ (%)	66 (86.8)	10 (13.2)	76 (100.0)	2	48	126
合計 (%)	5,386 (97.5)	140 (2.5)	5,526 (100.0)	44	3,045	8,615
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	5,386 (97.5)	140 (2.5)	5,526 (100.0)	44	3,045	8,615
平均	62.82	74.51	63.11	65.61	63.20	63.16
標準偏差	14.56	10.69	14.59	14.37	14.28	14.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0541##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査