

表 646 大腿骨近位部骨折の既往 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	2,271 (97.8)	51 (2.2)	2,322 (100.0)	31	1,265	3,618
2年～ (%)	1,865 (96.9)	60 (3.1)	1,925 (100.0)	7	1,052	2,984
5年～ (%)	958 (97.6)	24 (2.4)	982 (100.0)	3	590	1,575
10年～ (%)	197 (98.5)	3 (1.5)	200 (100.0)	3	86	289
15年～ (%)	63 (98.4)	1 (1.6)	64 (100.0)		21	85
20年～ (%)	20 (100.0)		20 (100.0)		8	28
25年～ (%)	4 (100.0)		4 (100.0)		5	9
30年～ (%)	4 (80.0)	1 (20.0)	5 (100.0)		1	6
35年～ (%)					1	1
40年～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	5,384 (97.5)	140 (2.5)	5,524 (100.0)	44	3,029	8,597
不明 (%)	2 (100.0)		2 (100.0)		16	18
記載なし (%)						
総計 (%)	5,386 (97.5)	140 (2.5)	5,526 (100.0)	44	3,045	8,615
平均	3.06	3.11	3.06	1.93	2.98	3.03
標準偏差	3.61	3.62	3.61	3.53	3.33	3.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0542##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査