

表 647 大腿骨近位部骨折の既往 原疾患別 (腹膜透析患者)

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	1,718 (98.4)	28 (1.6)	1,746 (100.0)	13	907	2,666
慢性腎孟腎炎 (%)	73 (98.6)	1 (1.4)	74 (100.0)		23	97
急速進行性糸球体腎炎 (%)	36 (90.0)	4 (10.0)	40 (100.0)		21	61
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	21 (100.0)		21 (100.0)		3	24
その他の分類不能の腎炎 (%)	49 (98.0)	1 (2.0)	50 (100.0)		25	75
多発性囊胞腎 (%)	166 (99.4)	1 (0.6)	167 (100.0)	1	104	272
腎硬化症 (%)	704 (96.4)	26 (3.6)	730 (100.0)	6	370	1,106
悪性高血圧 (%)	62 (95.4)	3 (4.6)	65 (100.0)		41	106
糖尿病性腎症 (%)	1,691 (97.1)	51 (2.9)	1,742 (100.0)	17	987	2,746
SLE腎炎 (%)	31 (96.9)	1 (3.1)	32 (100.0)		23	55
アミロイド腎 (%)	8 (88.9)	1 (11.1)	9 (100.0)		7	16
痛風腎 (%)	16 (100.0)		16 (100.0)		7	23
先天性代謝異常による腎不全 (%)	12 (100.0)		12 (100.0)		5	17
腎・尿路結核 (%)					1	1
腎・尿路結石 (%)	17 (100.0)		17 (100.0)		4	21
腎・尿路腫瘍 (%)	8 (100.0)		8 (100.0)		4	12
閉塞性尿路障害 (%)	12 (100.0)		12 (100.0)		8	20
骨髓腫 (%)	4 (100.0)		4 (100.0)		3	7
腎形成不全 (%)	45 (100.0)		45 (100.0)		20	65
不明 (%)	516 (96.6)	18 (3.4)	534 (100.0)	6	349	889
再導入 (%)	37 (97.4)	1 (2.6)	38 (100.0)		27	65
その他 (%)	160 (97.6)	4 (2.4)	164 (100.0)	1	106	271
合計 (%)	5,386 (97.5)	140 (2.5)	5,526 (100.0)	44	3,045	8,615
記載なし (%)						
総計 (%)	5,386 (97.5)	140 (2.5)	5,526 (100.0)	44	3,045	8,615

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D0543##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査