

表 649 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 治療方法別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

治療方法	なし	あり				合計	不明	記載なし	総計				
		剥離手術既往あり		剥離手術既往なし									
		ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし	ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし								
施設血液透析 (%)	4,698 (91.1)	332 (6.4)	33 (0.6)	50 (1.0)	44 (0.9)	5,157 (100.0)	121	549	5,827				
血液透析濾過 (%)	2,031 (91.7)	133 (6.0)	6 (0.3)	24 (1.1)	20 (0.9)	2,214 (100.0)	63	239	2,516				
血液濾過 (%)	1 (100.0)					1 (100.0)			1				
血液吸着透析 (%)	39 (84.8)	6 (13.0)		1 (2.2)		46 (100.0)	2	3	51				
在宅血液透析 (%)	79 (88.8)	8 (9.0)		2 (2.2)		89 (100.0)	2	8	99				
腹膜透析 (%)	5,481 (99.3)	23 (0.4)		3 (0.1)	11 (0.2)	5,518 (100.0)	77	3,020	8,615				
合計 (%)	12,329 (94.7)	502 (3.9)	39 (0.3)	80 (0.6)	75 (0.6)	13,025 (100.0)	265	3,819	17,109				
記載なし (%)													
総計 (%)	12,329 (94.7)	502 (3.9)	39 (0.3)	80 (0.6)	75 (0.6)	13,025 (100.0)	265	3,819	17,109				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0610##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査