

表 651 被嚢性腹膜硬化症 (EPS) の既往 併用の状況別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

併用の状況	なし	あり				合計	不明	記載なし	総計
		剥離手術既往あり		剥離手術既往なし					
		ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし	ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし				
HD(F)単独	6,659	476	38	72	64	7,309	184	770	8,263
(%)	(91.1)	(6.5)	(0.5)	(1.0)	(0.9)	(100.0)			
PD単独	4,327	14		3	11	4,355	69	2,507	6,931
(%)	(99.4)	(0.3)		(0.1)	(0.3)	(100.0)			
HD(F)単独.PDカテあり	117	2	1	5		125		22	147
(%)	(93.6)	(1.6)	(0.8)	(4.0)		(100.0)			
PD.HD併用週1HD(F)	1,030	9				1,039	7	450	1,496
(%)	(99.1)	(0.9)				(100.0)			
PD.HD併用週2HD(F)	124					124	2	32	158
(%)	(100.0)					(100.0)			
PD.HD併用週3HD(F)	27	1				28	3	2	33
(%)	(96.4)	(3.6)				(100.0)			
PD.HD併用週4HD(F)	1					1			1
(%)	(100.0)					(100.0)			
PD.HD併用その他	42					42		18	60
(%)	(100.0)					(100.0)			
合計	12,327	502	39	80	75	13,023	265	3,801	17,089
(%)	(94.7)	(3.9)	(0.3)	(0.6)	(0.6)	(100.0)			
不明	2					2		3	5
(%)	(100.0)					(100.0)			
記載なし								15	15
(%)									
総計	12,329	502	39	80	75	13,025	265	3,819	17,109
(%)	(94.7)	(3.9)	(0.3)	(0.6)	(0.6)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0612##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査