

表 653 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 年齢(歳)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

年齢	なし	あり				合計	不明	記載なし	総計				
		剥離手術既往あり		剥離手術既往なし									
		ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし	ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし								
15歳未満 (%)	55 (87.3)			1 (1.6)	7 (11.1)	63 (100.0)		24	87				
15歳～ (%)	132 (96.4)	2 (1.5)	2 (1.5)		1 (0.7)	137 (100.0)	2	38	177				
30歳～ (%)	946 (94.6)	43 (4.3)	1 (0.1)	4 (0.4)	6 (0.6)	1,000 (100.0)	27	293	1,320				
45歳～ (%)	3,223 (94.9)	124 (3.7)	13 (0.4)	24 (0.7)	13 (0.4)	3,397 (100.0)	61	1,021	4,479				
60歳～ (%)	5,727 (94.1)	265 (4.4)	16 (0.3)	36 (0.6)	41 (0.7)	6,085 (100.0)	128	1,678	7,891				
75歳～ (%)	2,142 (95.8)	67 (3.0)	7 (0.3)	14 (0.6)	7 (0.3)	2,237 (100.0)	44	713	2,994				
90歳～ (%)	104 (98.1)	1 (0.9)		1 (0.9)		106 (100.0)	3	52	161				
合計 (%)	12,329 (94.7)	502 (3.9)	39 (0.3)	80 (0.6)	75 (0.6)	13,025 (100.0)	265	3,819	17,109				
不明 (%)													
記載なし (%)													
総計 (%)	12,329 (94.7)	502 (3.9)	39 (0.3)	80 (0.6)	75 (0.6)	13,025 (100.0)	265	3,819	17,109				
平均	62.77	62.59	61.85	63.19	56.97	62.73	63.19	63.10	62.82				
標準偏差	13.39	11.76	13.26	13.40	20.01	13.39	12.78	14.02	13.52				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0614##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査