

表 654 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析歴(年)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

透析歴	なし	あり				合計	不明	記載なし	総計				
		剥離手術既往あり		剥離手術既往なし									
		ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし	ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし								
2年未満	2,849	28	5	6	6	2,894	50	1,313	4,257				
(%)	(98.4)	(1.0)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(100.0)							
2年～	3,148	46	3	3	7	3,207	51	1,192	4,450				
(%)	(98.2)	(1.4)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(100.0)							
5年～	2,967	103	8	15	21	3,114	46	837	3,997				
(%)	(95.3)	(3.3)	(0.3)	(0.5)	(0.7)	(100.0)							
10年～	1,551	82	10	18	17	1,678	53	234	1,965				
(%)	(92.4)	(4.9)	(0.6)	(1.1)	(1.0)	(100.0)							
15年～	821	95	7	19	9	951	26	119	1,096				
(%)	(86.3)	(10.0)	(0.7)	(2.0)	(0.9)	(100.0)							
20年～	515	78	4	13	9	619	16	65	700				
(%)	(83.2)	(12.6)	(0.6)	(2.1)	(1.5)	(100.0)							
25年～	249	55	1	3	5	313	17	30	360				
(%)	(79.6)	(17.6)	(0.3)	(1.0)	(1.6)	(100.0)							
30年～	118	14		2	1	135	2	8	145				
(%)	(87.4)	(10.4)		(1.5)	(0.7)	(100.0)							
35年～	61	1	1	1		64	2	5	71				
(%)	(95.3)	(1.6)	(1.6)	(1.6)		(100.0)							
40年～	47					47	2		49				
(%)	(100.0)					(100.0)							
合計	12,326	502	39	80	75	13,022	265	3,803	17,090				
(%)	(94.7)	(3.9)	(0.3)	(0.6)	(0.6)	(100.0)							
不明	3					3		16	19				
(%)	(100.0)					(100.0)							
記載なし													
(%)													
総計	12,329	502	39	80	75	13,025	265	3,819	17,109				
(%)	(94.7)	(3.9)	(0.3)	(0.6)	(0.6)	(100.0)							
平均	7.20	14.20	11.49	13.91	11.73	7.55	9.64	4.44	6.89				
標準偏差	7.52	8.40	7.97	8.18	7.66	7.71	8.94	5.27	7.38				

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D0615##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査