

表 655 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

PD歴	なし	あり				合計	不明	記載なし	総計				
		剥離手術既往あり		剥離手術既往なし									
		ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし	ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし								
1年未満	1,138	3			3	1,144	26	143	1,313				
(%)	(99.5)	(0.3)			(0.3)	(100.0)							
1年～	1,012	2				1,014	9	187	1,210				
(%)	(99.8)	(0.2)				(100.0)							
2年～	1,319	4			4	1,327	10	193	1,530				
(%)	(99.4)	(0.3)			(0.3)	(100.0)							
4年～	709	3			2	715	7	110	832				
(%)	(99.2)	(0.4)			(0.1)	(100.0)							
6年～	355	1			1	357	5	54	416				
(%)	(99.4)	(0.3)			(0.3)	(100.0)							
8年～	142	2				144	1	37	182				
(%)	(98.6)	(1.4)				(100.0)							
10年～	180	1			1	183	6	34	223				
(%)	(98.4)	(0.5)			(0.5)	(100.0)							
合計	4,855	16			3	4,884	64	758	5,706				
(%)	(99.4)	(0.3)			(0.1)	(0.2)	(100.0)						
記載なし	7,474	486	39	77	65	8,141	201	3,061	11,403				
(%)	(91.8)	(6.0)	(0.5)	(0.9)	(0.8)	(100.0)							
総計	12,329	502	39	80	75	13,025	265	3,819	17,109				
(%)	(94.7)	(3.9)	(0.3)	(0.6)	(0.6)	(100.0)							
平均	3.14	4.37		7.53	4.31	3.15	3.26	3.40	3.18				
標準偏差	3.02	3.82		3.37	5.08	3.03	3.82	3.45	3.10				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0616##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査