

表 656 被嚢性腹膜硬化症(EPS)の既往 原疾患別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

原疾患	なし	あり				合計	不明	記載なし	総計
		剥離手術既往あり		剥離手術既往なし					
		ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし	ステロイド 使用歴あり	ステロイド 使用歴なし				
慢性糸球体腎炎 (%)	4,772 (92.9)	255 (5.0)	25 (0.5)	47 (0.9)	38 (0.7)	5,137 (100.0)	108	1,239	6,484
慢性腎盂腎炎 (%)	179 (92.7)	12 (6.2)		1 (0.5)	1 (0.5)	193 (100.0)	2	44	239
急速進行性糸球体腎炎 (%)	79 (94.0)	3 (3.6)		1 (1.2)	1 (1.2)	84 (100.0)	3	28	115
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	70 (88.6)	7 (8.9)		2 (2.5)		79 (100.0)	2	10	91
その他の分類不能の腎炎 (%)	95 (94.1)	4 (4.0)			2 (2.0)	101 (100.0)	1	27	129
多発性嚢胞腎 (%)	359 (95.2)	13 (3.4)		1 (0.3)	4 (1.1)	377 (100.0)	3	129	509
腎硬化症 (%)	1,255 (96.3)	35 (2.7)	4 (0.3)	4 (0.3)	5 (0.4)	1,303 (100.0)	26	415	1,744
悪性高血圧 (%)	128 (98.5)	2 (1.5)				130 (100.0)	3	42	175
糖尿病性腎症 (%)	3,446 (96.9)	80 (2.2)	8 (0.2)	12 (0.3)	10 (0.3)	3,556 (100.0)	61	1,176	4,793
SLE腎炎 (%)	77 (90.6)	6 (7.1)		2 (2.4)		85 (100.0)	3	27	115
アミロイド腎 (%)	18 (100.0)					18 (100.0)		7	25
痛風腎 (%)	44 (93.6)	3 (6.4)				47 (100.0)		16	63
先天性代謝異常による腎不全 (%)	24 (92.3)	2 (7.7)				26 (100.0)		6	32
腎・尿路結核 (%)	6 (100.0)					6 (100.0)		2	8
腎・尿路結石 (%)	27 (100.0)					27 (100.0)		4	31
腎・尿路腫瘍 (%)	21 (91.3)	1 (4.3)	1 (4.3)			23 (100.0)		5	28
閉塞性尿路障害 (%)	25 (96.2)			1 (3.8)		26 (100.0)	2	11	39
骨髄腫 (%)	7 (100.0)					7 (100.0)		3	10
腎形成不全 (%)	89 (84.8)	10 (9.5)		1 (1.0)	5 (4.8)	105 (100.0)	1	24	130
不明 (%)	1,113 (95.0)	46 (3.9)	1 (0.1)	7 (0.6)	5 (0.4)	1,172 (100.0)	40	433	1,645
再導入 (%)	136 (93.2)	9 (6.2)			1 (0.7)	146 (100.0)	5	37	188
その他 (%)	359 (95.2)	14 (3.7)		1 (0.3)	3 (0.8)	377 (100.0)	5	134	516
合計 (%)	12,329 (94.7)	502 (3.9)	39 (0.3)	80 (0.6)	75 (0.6)	13,025 (100.0)	265	3,819	17,109
記載なし (%)									
総計 (%)	12,329 (94.7)	502 (3.9)	39 (0.3)	80 (0.6)	75 (0.6)	13,025 (100.0)	265	3,819	17,109

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D0617##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査